

Aus der Klinik und Poliklinik für Mund-, Zahn- und Kiefer-  
krankheiten der Universität Bonn.  
Direktor: PROF. DR. PROELL

---

Die Ursache, Behandlung und Verlauf der in der  
Mund-, Zahn-Kieferklinik in den letzten Jahren zur  
Beobachtung gekommenen Kiefer-Osteomyelitiden  
im Vergleich zu den Knochenerkrankungen des übrigen  
Körpers. (Alter, Geschlecht, Beruf)

# Inaugural-Dissertation

zur Erlangung

der

zahnärztlichen

DOKTORWÜRDE

der

Hohen medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelm-Universität in Bonn

vorgelegt am 23. 9. 1936

von

OTTO SCHWELLENBACH

Zahnarzt aus Bonn.

---

B o n n 1 9 3 6

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät  
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. PROELL



Vieles ist schon über die Entzündungen des Knochenmarks geschrieben worden. Fast jeder Autor belegte die Krankheit mit einem anderen Namen oder benutzte eine nicht ganz zutreffende Bezeichnung für die Knochenmarksentzündung. Daß natürlich die richtige Bezeichnung nicht immer gewählt wird, liegt häufig an falscher bzw. nicht ganz vollendeter Diagnose, denn die Übergänge der Knochenentzündungen allgemein bis zur Osteomyelitis im besonderen sind schwer feststellbar und oft verwischt, außerdem noch von der Entstehungsart abhängig.

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts brachte Chassaignac wohl als erster die Bezeichnung Osteomyelitis für die Knochenmarksentzündung, was den großen Kampf um den Namen der Krankheit anfachte. Zehn Jahre später folgten über Osteomyelitis die 30 Thesen Roders, und Klementowsky schrieb im 8. Jahrzehnt über die Kieferosteomyelitis; dann wurde Ostitis vorgeschlagen, da ja meist auch das Periost mit erkrankt sei. Panostitis als Bezeichnung folgte aus ähnlichen Gründen; Partsch und Lexer wollten die Erkrankung als eitrige Ostitis bezeichnet sehen, worauf Goldschmidt den Spieß umdrehte und für Periostitis und Ostitis den Sammelnamen Osteomyelitis einführen wollte.

Hier soll nun der Unterschied der Kieferosteomyelitis und der Knochenmarksentzündung des übrigen Körpers beschrieben werden mit besonderer Berücksichtigung von Beruf, Geschlecht, Alter und Ursachen. Ebenso sollen die Unterschiede der Heilung, therapeutische Maßnahmen und der Verlauf der Osteomyelitis festgestellt werden.

Was ist nun Osteomyelitis, oder besser welches sind die pathologischen Veränderungen im Knochenmark bei dieser Krankheit?

Der Prozeß kann lokal entstehen oder hämatogen. Letzterenfalls beginnt er wohl nicht direkt im Mark, da die anatomischen Vorbedingungen zur Entstehung dort nicht so günstig sind, wie unter der Knochenhaut. Dort haben nämlich die Blutgefäße durch die engen Knochenkanälchen ein fünfmal kleineres Lumen, als im Mark selbst. Von diesen subperiostalen Primärherden geht die Eiterung aus und zwar auf das Mark, bzw. in die Spongiosa. Also: „Es gibt zwei Eiterherde bei der Osteomyelitis: einen subperiostal gelegenen Herd und einen im Markkanal im Knochen gelegenen Herd“ (Lejars). Wie bei allen Entzündungen tritt zuerst eine erhöhte Blutzufuhr ein, die sogar Blutungen hervorrufen kann. Dabei wird das Mark lebhaft rot gefärbt, endlich graurot bis gelblich. Anschließend treten die ersten eitrigen Einschmelzungen in Form einzelner Herde oder mehr diffus auf. Die Spongiosa wird weiter eingeschmolzen, und die Eiterung ergreift die Kompakta, die am längsten Widerstand leistet. Inzwischen ist dann auch vom subperiostalen Herd die Eiterung durch die Emmissarien an die Oberfläche des Knochens, das Periost, gedrungen. „Die Kompakta zeigt Knochenkarie oder bei vollständiger Aufhebung der Ernährung Nekrose, die sich in Sequesterbildung zeigt“ (Port-Euler). An sich sind die pathologischen Veränderungen immer gleich, ob nun die Osteomyelitis hämatogen oder traumatisch entstanden ist. Letzterenfalls beginnt sie mit einer Periostitis, wobei die Knochenhaut stark gerötet und durch Eiter vom Knochen abgehoben wird. Die Entzündung geht weiter durch die Havers'schen Kanäle bis zur Oberfläche der Kortikalis, die nun ihrerseits erkrankt. Bei kurzen und platten Knochen greift die Eiterung meist ohne weiteres ins Mark über, bei den langen Röhrenknochen dagegen zum Unterschied hauptsächlich nach Gelenkeiterung mit folgender Gelenkknorpelzerstörung. Besonders günstig zur Ergreifung des Marks sind naturgemäß bis zum Mark freiliegende und infizierte Frakturen. Eine Ausnahme bilden hier die Kiefer, die bei kom-

pliziert freiliegenden Frakturen gut heilen und selten eine Osteomyelitis daraufhin zeigen.

Vom Periost aus wird im weiteren Verlauf neuer Knochen gebildet und zwar ziehen Fistelgänge durch diese Neubildung, und somit hat der Eiter Abfluß nach außen. Lexer unterscheidet eine zentrale Nekrose, wenn die inneren Schichten des Schaftes oder tiefliegende Teile der Spongiosa absterben, und eine äußere, oberflächliche Nekrose bei periostaler oder kortikaler Eiterung. Der abgestorbene, blutleere und weiße Knochen ist massenhaft von Bakterien verseucht, und er ruft in seiner Umgebung eine reaktive Entzündung hervor. Diese hat zwei Wirkungen, eine rarefizierende oder demarkierende und eine osteoplastische. Lexer sagt weiter, daß an der Grenze von totem und noch lebendem Knochengewebe aus dem gesunden Mark der Diaphyse, der Spongiosa und der Havers'schen Kanäle Granulationen wachsen, welche durch Einschmelzung allmählich jede Verbindung lösen, sodaß endlich überall zwischen dem gelösten Sequester und dem gesunden Knochengewebe ein mit Granulationen und Eiter gefüllter Zwischenraum, der Demarkationsgraben vorhanden ist. Diese Granulationen müssen doch ganz hervorragende Eigenschaften besitzen, denn sie werden wochenlang von Eiter belpült und können dessen hochvirulente Stoffe vom übrigen Knochen fernhalten. Versiegt der Eiter, und wird der Sequester entfernt, so tritt, je eher er entfernt wird, um so schneller und schöner Regeneration ein. Wird er nicht entfernt, so suchen ihn die Granulationen zu zernagen, zu verkleinern oder ihn ganz aufzulösen, oder er bleibt vom Granulationschutzwall eingebettet liegen (Hesse). Das Granulationsgewebe ist also ein Heilorgan, das abwehrende, resorbierende und regeneratorsche Kraft besitzt und bei der Operation nicht immer entfernt werden muß. Die Granulationen sondern Fermente ab, durch deren Einfluß jeder Sequester bestimmte Formen erhält. Außerdem ist natürlich die Art des Knochens und der Sitz der Krankheit entscheidend für das Aussehen der Sequester. Bis zur Abstoßung können Wochen und Monate vergehen, oder es tritt der Fall ein, daß der Sequester liegen bleibt und vom Granulationsgewebe resorbiert wird.

Nach oder neben diesen Vorgängen resorbiven oder defensiven Charakters tritt der Neuaufbau in sein Recht, wobei Menge und Art des Eiters oft den Heilungsverlauf verzögern. Die eigentliche Heilung beginnt mit der Knochenneubildung, die vom Periost ausgeht. Die Erfahrung lehrt, daß die Heilungstendenz dabei gut bei langen Röhrenknochen ist und schlecht bei platten.

Die Kiefer machen hierbei eine Ausnahme, doch darüber später.

Bei oder nach der Osteomyelitis können mannigfaltige Komplikationen auftreten, die nur kurz erwähnt werden sollen: spontane Frakturen, Pseudarthrosen, Luxationen, Ankylosen, Wachstumsstörungen, Erkrankung der Gelenke, Gelenkhydrops, Metastasen, Phlegmonen, Phlebitiden, Thrombophlebitiden, Septikämie, Toxämie, Pyophagie, Neuralgien und Hyperostosen. Bei den Kieferosteomyelitiden treten noch hinzu: Verlust der Zähne, Neuralgien des Facialis bis zur Paralyse, Glottisödeme, Empyem der Kieferhöhlen, Orbitalphlegmonen, Gehörstörungen, Übergreifen auf die Schädelbasis usw.

Beträchtlich sind oft die kosmetischen Schäden, besonders empfindlich nach schweren Kieferosteomyelitiden.

Was nun die Arten der Osteomyelitis betrifft, ist noch folgendes zu sagen. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen lokal entstandener und hämatogener Osteomyelitis. Natürlich gibt es auch, wie bei allen Entzündungen akute und chronische Stadien der lokalen wie auch der

hämato-genen Form. Es fehlen auch nicht die Zwischenstadien, die subakuten und subchronischen Fälle. Ein außerordentlich trauriges Bild geben die chronisch rezidivierenden Fälle, die oft den Patienten sein ganzes Leben quälen und zur Verzweiflung bringen. Die purulente Form ist noch zu erwähnen, ferner die Osteomyelitis tuberkulosa, gummosa und die Phosphornekrose der Kiefer.

Bei lokal entstandener Osteomyelitis kann der Sitz natürlich überall sein. Bei hämatogener Form ist hauptsächlich das Mark der Diaphysen und der spongiosen Teile des Knochens, seltener die Kortikalis und das Periost betroffen. Die Osteomyelitis purulenta hämatogena bevorzugt die Metaphysengegend der langen Röhrenknochen. Im allgemeinen ist es so, daß da, wo tuberkulöse Herde häufig sind, Osteomyelitis selten vorkommt.

Zu den klinischen Erscheinungen gehören außer den lokalen Erscheinungen noch folgende allgemeine: meist erhöhte Temperatur, oft Schüttelfröste, Appetitlosigkeit, Durchfälle oder Verstopfungen, allgemeine Schwäche, häufig Delirien. Der Puls wird klein und häufig. Kurz möchte ich einige Krankengeschichten anführen.

1. Patient drei Jahre alt, Kind eines Arbeiters, bekam während des Scharlachs plötzlich Schwellung des Unterarms, die schon früher einmal aufgetreten war, erfolgte Operation Sequestrotomie und Drainage. Gute Besserung wurde erzielt, der Radius war fast ganz sequestriert mit starken Kloaken.

2. Eine 44 Jahre alte Hausfrau erhielt einen Stoß gegen die Brust, es entstand eine Rippenfellentzündung mit anschließender Osteomyelitis der Rippen; Allgemeinerscheinungen waren Husten, Fieber und Durchfälle, die Unterkieferdrüsen waren geschwollen; als Therapie wurde Wärme gegeben mit Erfolg.

3. Ein 1 Jahr altes Kind hatte eine Pneumonie. Nach vier Tagen trat plötzlich Schwellung am Oberschenkel ein und Schmerz, außerdem kam aus einer Fistel Eiter. Behandlung bestand in Inzision. Es wurden Pneumokokken vorgefunden.

4. Ein ein Jahr altes Mädchen litt an Wasserpocken. Vier Tage nach Eintritt derselben traten am Oberschenkel Schmerzen auf, hinzu kamen Fieber und allgemeine Müdigkeit. Die Behandlung bestand in Trepanationen, die Heilung verlief glatt.

5. Ein 62 Jahre alter Landwirt leidet seit seinem achten Lebensjahr an Unterschenkelosteomyelitis. Diese wiederholt sich alle 8—9 Jahre trotz jeweiliger Operationen. Als Erreger wurde der Staphylokokkus pyogenes aureus ermittelt. Nach nochmaliger Operation wurde der Patient geheilt entlassen.

6. Eine 35jährige Hausfrau bekam während der Geburt von Zwillingen Schmerzen am Humerus, ohne daß eine andere Krankheit eruiert werden konnte. Die Behandlung bestand in Anbetracht des Zustandes der Patientin in Kurzwellenbestrahlung, die mit gutem Erfolg gegeben wurde.

Aus den mir zur Verfügung stehenden 400 Fällen der chirurgischen Universitätsklinik möchte ich nur die oben aufgeführten herausgreifen, da sie besonders aufschlußreich sind.

Immer wieder liest man in den Krankengeschichten, in denen das Trauma oder eine Vorkrankheit eine Rolle spielen, die Worte: 4 Tage später plötzlich Schmerz und Schwellung . . . . Die Kenntnis dieses Latenzstadiums, das sich maximal auf 14 Tage erstrecken kann, ist unbedingt wichtig zur Begutachtung einer Unfallossteomyelitis. Frühestens nach zwei Tagen traten die ersten deutlichen Krankheitsanzeichen der Osteomyelitis

in einigen Fällen auf. Es ist dies das Minimum an Zeit, was die Erreger zu ihrer Entwicklung und Vermehrung benötigen.

Verhältnismäßig oft trifft man weiter auf den Satz in den Krankengeschichten der Erwachsenen: seit dem 12. . . . Lebensjahr, oder seit dem 8. oder seit dem 16. ufw. leidet der Patient an Osteomyelitis. Dauernde Wiederholungen . . . .

Nicht selten heißt es: vor Jahren Fall oder Schlag auf den betreffenden Knochen. Oft dort Schmerzen, die sich wieder legten.

Patienten mit 10—15 Operationen sind absolut keine Seltenheit.

Schon diese wenigen Sätze charakterisieren den möglichen Verlauf und die evtl. Zähigkeit der Osteomyelitis.

Besonders wichtig ist bei der schweren Krankheit die Differentialdiagnose. In Betracht kommen: tiefe Lymphangitis, lymphangene Phlegmone, Muskeleiterungen, Sarkome, Tuberkulose, Gumma des Knochens, Knochencysten, Aktinomykose, Rheumatismus, Periostitis und je nach Sitz auch schon einmal Unterleibstypus.

Über das Alter der Patienten ist zu sagen, daß eine besondere Bevorzugung der jugendlichen Menschen festzustellen ist. Bei der Durchsicht von 383 Fällen in der Bonner Chirurgischen Universitätsklinik stellten sich 263 Fälle als von Osteomyelitis im Alter bis zu 20 Jahren heraus. Ein starkes Übergewicht des jugendlichen und besonders des Säuglingsalters ist, wie später folgt, bei den Kieferosteomyelitiden festzustellen. Bei der Betrachtung der Todesfälle Jugendlicher nach Osteomyelitis ergibt sich noch ein besonderes Bild. Von 28 letalen Krankheitsausgängen überhaupt sind 25 von Jugendlichen. Das ist eine überraschend hohe Zahl. Der Grund zur häufigen Osteomyelitis bei Jugendlichen ist allgemein der größere Gefäßreichtum ihrer Knochen, auch ist das Mark zellreicher, während beim Erwachsenen mehr Fettmark ist. Außerdem spielt natürlich die noch nicht ausgebildete Abwehrkraft eine Rolle, wie noch folgen wird.

Was das Geschlecht anbetrifft, ist bei den Osteomyelitiskranken zu sagen, daß ein auffallend geringer Prozentsatz weiblicher Patienten vorhanden ist, er beträgt ungefähr 24% (89 Fälle). Das rührt aber größtenteils daher, daß das Unfallmoment der weiblichen Berufe wesentlich geringer ist, als das der männlichen Patienten. So sollte man meinen. In Wirklichkeit beträgt die Unfallostomyelitis nur 30% der Krankheitsursachen überhaupt. Allen anderen Einflüssen ist das weibliche Geschlecht ja genau so ausgesetzt wie das männliche. Also kann man sagen, daß das Geschlecht bei der Beteiligung der Fälle nicht ganz indifferent ist, allerdings nicht am eigentlichen Krankheitsverlauf. Frappierend aber ist dann wieder die hohe Sterblichkeit mit 9 von den insgesamt 28 Todesfällen, also ein Drittel der Todesfälle bei einem Viertel der Beteiligung des weiblichen Geschlechtes. Es muß also festgestellt werden, daß Jugendliche und auch weibliche Osteomyelitiskranke dem Einbruch der Krankheit nicht immer die Widerstandskraft entgegenzusetzen haben, wie die männlichen Patienten mittleren und höheren Alters. Daß aber die Heilungstendenz bei weiblichen Patienten auch im hohen Alter nicht erlischt, beweist ein Fall einer 80 Jahre alten Witwe mit auffallend rascher Heilung. Es ist dies nicht der einzige Fall, sondern dem stehen noch etliche andere zur Seite im Alter von 70, 67 und 66 Jahren.

Nun zur Anteilnahme der Berufe an dieser Krankheit. Da steht an erster Stelle der einfache Arbeiter mit 80 Fällen. Rechnen wir Schmiede, Schlosser, Handwerker und Maurer noch hinzu als sozial und nach Unfallmöglichkeit gleichgestellt, so kommen weitere 66 Fälle hinzu. Ein weiteres Hauptkontingent bildet der Beruf der Landwirte, Bauern, Win-

zer und Ackerer, alles erdgebundene Berufe. Sie stellen 78 Patienten. Die nächsthöhere Anzahl weisen die Soldaten des Weltkrieges auf; 30 Männer haben seit Kriegsende in der Bonner Chirurgischen Universitätsklinik mit Osteomyelitis gelegen. Allen drei genannten Gruppen müssen dieselben Bedingungen für die Erkrankung zugebilligt werden. Aus den sozial gehobenen Berufen fehlt fast jede Klientel. Es sind im Höchstfalle 35 Patienten. Nun mag das auch daran liegen, daß diese sich nicht alle im Krankenhaus behandeln lassen, sondern sich dank ihrer finanziellen Lage zu Hause oder in Privatkliniken behandeln lassen können. So hoch kann aber nach Umfrage bei einigen Ärzten deren Zahl nicht sein, daß sie entscheidend ins Gewicht fiele. Es ist die Osteomyelitis also in Wahrheit eine „Morbus pauperum“. Die restlichen 100 Fälle setzen sich aus Patienten ohne Berufsangabe zusammen, darunter hauptsächlich Frauen und die Kinder, die noch nicht im Beruf stehen, zu zählen sind.

Vollkommen übereinstimmend ist bei der Anteilnahme der Berufe auch die gleiche Reihenfolge der Frequenz bei den Todesfällen infolge Osteomyelitis. An der Spitze steht der Arbeiter und Handwerker mit 12, dann der Landwirt mit 8, die Berufslosen mit 7 und am Schluß 1 als Schüler.

Am Ausgang der Krankheit ist der Beruf bzw. die soziale Stellung danach nicht maßgebend, wohl aber an der Empfänglichkeit für die Osteomyelitis. Man sollte nun meinen, daß in den Nachkriegsjahren und in der Inflationszeit die Sterblichkeit größer gewesen sei als sonst. Das ist aber nicht so, die Zahl der Todesfälle verteilt sich vielmehr ziemlich gleichmäßig von 1918 bis 1935. Auch die Schnelligkeit der Heilung ist nach den vorliegenden Krankengeschichten absolut unabhängig von den Jahren sozialen Niedergangs. Nur ganz wenige Fälle der Jahre 1918—24 tragen den Vermerk einer langsamen Heilung; daraus nun Schlüsse zu ziehen wäre falsch, da ja auch andere Ursachen einen viel entscheidenderen Einfluß auf die Heilungszeit ausüben können.

Weniger interessant sind die unmittelbaren Todesursachen. Da steht bei den 28 Fällen naturgemäß die Sepsis mit 19 an der Spitze. Fünfmal war Herzschwäche, oft während oder sofort nach der Operation eingetreten, der Todesgrund. Zwei Pneumonien sind ferner angegeben worden, ein Gehirnabzёß als direkte Metastase einer Stirnbeinosteomyelitis. Der restliche Fall wurde nicht begründet.

Erwähnenswert aber ist bei den Todesfällen der jeweilige Sitz der Krankheit. Tibia, Femur und Humerus sind an erster Stelle gemäß ihrer Beteiligung an der Krankheit überhaupt. Dann kommen gleich die weniger und ganz wenig befallenen Knochen wie die Clavicula, das Planum poplit., das Os ileum und das Stirnbein mit je einem Todesfall.

Nach Kieferosteomyelitis wurde nach dem Material, das mir zur Verfügung stand, kein Todesfall beobachtet, was natürlich nicht besagen will, daß Todesfälle hierbei nicht vorkommen. In der Literatur werden mehrere Fälle berichtet mit letalem Ausgang.

Wendet man sich jetzt dem Sitz der Osteomyelitis zu, so findet man, wie schon erwähnt, als meist beteiligte Knochen die Tibia, den Femur und Humerus. Diese drei Knochen sind die ganz augenfällig von der Krankheit bevorzugten Ansiedlungsstellen. Wiederum gelangt man leicht zu Trugschlüssen, indem man sagt, daß ja auch diese Knochen ganz besonders den traumatischen und ähnlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Das ist zum Teil richtig. Aber wenn man sieht, daß z. B. von 149 Osteomyelitiden der Tibia nur 62 auf direkt traumatische Weise entstanden sind, während bei den anderen 87 Fällen keine Ursachen, d. h. auch keine direkten Ursachen genannt werden, die unbedingt gerade eine Osteomyelitis der Tibia hervorgerufen hätten, dann muß man feststellen, daß das trauma-

tische Moment doch eine untergeordnete Rolle in der Entstehungsart dieser Krankheit spielt. Genau so ist die Sache beim Femur: von 125 Fällen sind nur 44 mit direktem Anlaß zur Osteomyelitis des Femurs, während 81 Fälle ohne diesen Anlaß sind. Beim Humerus ist das Verhältnis 23:32.

Der nächst meist frequentierte Knochen ist der Unterkiefer mit 21 beobachteten Fällen. Doch glaube ich, daß dieser Knochen viel häufiger befallen wird, was nur meist nicht entdeckt wird, da die Krankheit ohne besondere klinische Erscheinungen verlaufen kann und auch oft durch Extraction des schuldigen Zahnes unbeobachtet zur Heilung gelangt. Doch darüber später.

Bei den übrigen Knochen ist das Verhältnis der traumatisch und durch andere direkte Ursachen entstandenen Osteomyelitis wie folgt: beim Radius 4:8, bei der Fibula 3:6, bei der Ulna 2:5, bei der Scapula 0:2, bei der Clavicula 2:3, beim Metatarsus 2:3, bei der Hüfte 0:2, bei der Rippe 1:1, ebenso beim Finger und beim Os ileum, beim Os ischium, Os zygomaticum und beim Sternum 0:1. Ausnahmen bilden der Trochanter 4:0, das Stirnbein 2:0 und die Hand mit 1:0. Diese letzten Fälle können aber wegen der kleinen Zahl der dort beobachteten Fälle nicht als Gegenbeweis herangezogen werden, zumal auch das Zahlenverhältnis in zu kleinen Grenzen bleibt.

Bezeichnend ist eine Angabe in der Literatur von Hedri über Osteomyelitis des Hüftgelenks bei Säuglingen. Ursachen waren: Trauma (Nabel-, Hand- und Brandwunden) Hautinfektion, Unfall, Diphtherie, oft Hals- oder Kopftrennung des Gelenks oder völlige Auflösung des Kopfes ohne Sequester. Niemals wurde bei Säuglingen Ankylose beobachtet. Daß die Osteomyelitis überall vorkommt, beweisen noch einige andere in der Literatur angegebene Fälle. Es handelt sich dort um zwei Osteomyelitiden der Wirbelsäule mit Beteiligung des Rückenmarks. Plenz sagt weiter in dem betreffenden Artikel, daß er bisher in der Weltliteratur nur 87 Fälle von akuter Wirbelosteomyelitis gefunden hat; ein Beweis, wie selten diese Lokalisation ist. Schwarz berichtet ebenfalls 5 Fälle mit Beteiligung des Rückenmarks, wobei Pachymeningitis erzeugt wurde. Ferner wird berichtet von Osteomyelitis der Dornfortsätze, des Atlas und sogar 3 Fälle des Zungenbeins, entstanden durch Würgen am Halfe.

Eine weitere seltenere Lokalisation ist schließlich der Oberkiefer. Es standen 7 Fälle der hiesigen Universitäts Mund-, Zahn- und Kieferklinik zur Verfügung.

Sehr aufschlußreich ist das große Kapitel der Ursachen. Weitaus an der Spitze steht das Trauma. Dazu werden gerechnet: Stoß, Fall, Schlag, Wunden, Frakturen, Quetschungen und Verstauchungen. 91 Fälle rühren von diesen Insulten her. Dann kommen die Kriegsverletzungen, die meist aus Granatplitterverletzungen bestanden. An Häufigkeit folgt hinter diesen 30 Fällen dann die Osteomyelitis nach Abszessen und Geschwüren. Zwölfmal verursachten sie die Krankheit. Es folgt die Pneumonie mit 6 Fällen, dann in gleicher Weise mit 2—10 Fällen: Rippenfellentzündung Typhus, Diphtherie, Grippe, Masern, Scharlach, Rheumatismus, Halsentzündung, Erkältung, Tuberkulose, ferner Furunkel, Phlegmonen, Panaritien, Karbunkel, auch schon nach Überanstrengungen und Druck auf den betreffenden Knochen und durch Metastasen, ebenfalls auch nach früheren Operationen. Außerdem wurde Osteomyelitis nach Geburten beobachtet, ebenso nach Witterungsumschlag, wie der betreffende Patient meinte.

Die Ursache ist nicht ersichtlich in 180 Fällen, also bei der Minderheit.

Beachtlich ist weiter folgende Feststellung aus dem Jahre 1897 von H. F. Mantell: Er beobachtete 12230 Scharlachfälle mit 19 Osteo-

myelitiden der Kiefer und zwar waren davon 16 Fälle zurückzuführen auf mechanische Ursachen (Verletzung der Symphyse des Unterkiefers bei oft zwangsweiser Ernährung). 7 dieser 16 Fälle starben. Von den drei Oberkieferosteomyelitiden starb einer.

Wie vorsichtig man mit seinen Schätzungen sein muß, sieht man an dieser Aufstellung. Von den 12 230 Scharlachfällen während einer Epidemie in London nur 19 Kieferosteomyelitiden. Bei näherer Prüfung bleiben drei bestehen als durch Scharlach hervorgerufen bzw. begünstigt, eine verschwindend geringe Zahl: 3:12 230.

Auch Hesse ist der Ansicht, daß Osteomyelitis nach Masern und Scharlach zweifelhaft ist. Möglich ist die Infektionskrankheit als Ursache schon, besonders bei Kieferosteomyelitis. Die bisherigen Beobachtungen nach Infektionskrankheiten stammen meistens von Ärzten ohne zahnärztliche Vorbildung. Dann betont Hesse weiter zu Recht die Häufigkeit des Scharlachs gegenüber Osteomyelitis selbst. Er führt an, daß bei langem Bettliegen bei dieser Krankheit (Scharlach) die Mund- und Zahnpflege leidet, sodaß Entzündungen auftreten können, an die sich dann eine Osteomyelitis anschließen kann; ein zahnmarktoter Zahn gehört aber wohl dazu.

Außerdem kann ja auch rein zeitlich die Osteomyelitis und eine spezifische Infektionskrankheit zusammenfallen. Es beweist dies ein Fall, den Hesse anführt, wo Osteomyelitis bei Tuberkulose auftrat. Es kam zum Exitus letalis. Die histologische Untersuchung zeigte, daß die Osteomyelitis geheilt war und weder Tuberkelbazillen noch Granulationen zu finden waren bei der Untersuchung des osteomyelitischen Herdes. Die Osteomyelitis war also ausgeheilt trotz bestehender Tuberkulose.

Demgegenüber steht Partsch mit seinen Beobachtungen von Osteomyelitis nach Scharlach. Später behauptet er allerdings, daß die Kieferosteomyelitis nach Diphtherie, die ja meist mit schwerer Stomatitis einhergeht, durch direkte Epitheldefekte auf den Knochen übergeleitet worden ist. Salter und Fischer beobachteten Fälle nach Masern und Diphtherie. Fischer auch nach Pocken und Fürbringer nach Typhus und Dependorf nach Lues.

Es gibt nun aber tatsächlich nach Scharlach Osteomyelitis, sowohl der Kiefer als auch der übrigen Knochen. Entscheidend dabei ist aber keineswegs die vorangegangene Infektionskrankheit als solche, sondern vor allem der Zustand der Abwehrkräfte, also der Milz, Leber, Lymphdrüsen, kurz des reticulo-endothelialen Systems. Ist die Funktion dieses Systems eine schlechte, so erhalten die Erreger der Krankheit das Übergewicht. Warum versagt aber die Abwehrkraft? Man sagt, es sei zufällig eine ungünstige Immunitätslage, dann soll im Gegensatz zu anderen Knochenstellen die bakterizide Kraft der Metaphyse gering sein. Irgendeine Schädigung muß also dazu kommen, damit eben diese eine Metaphyse von den vielen anderen möglichen erkrankt.

Nach Infektionskrankheiten oder durch Vitaminmangel vor allem von Vitamin C ist der Organismus und der Abwehrapparat geschwächt und es kommt dann leicht zur Aktivierung latenter Herde.

Kuwahata hat sich ebenfalls mit Untersuchungen über Vitamin C befaßt. Er stellte dabei fest, daß sich bei dessen Mangel das Röhrenknochenende schnell verändert (Möller-Barlow'sche Krankheit) und damit aufnahmebereit wird für die im Blute kreisenden Erreger. Bewiesen wurde diese Behauptung durch Meerfischweinchenversuche.

Außerdem sind bei Jugendlichen die Abwehrkräfte wohl vorhanden, aber gewissermaßen noch nicht spezialisiert, sodaß der jugendliche Körper

schnell einer Osteomyelitis erliegen kann, wie es das Verhältnis der Todesfälle zum jugendlichen Alter beweist.

Als weitere Faktoren gelten auch nervöse Erkrankungen wie Tabes, Paralyse, Syringomelie, ferner die Infektionen wie Tuberkulose, Lues und Lepra. Auch Intoxikationen wie Phosphor, Quecksilber, Arsen, x-Strahlen und Chromsäure wirken prädisponierend. Daß im Gegenfatz zu diesen exogenen Intoxikationen auch die endogenen wie Diabetes, Nierenkrankheiten und Skorbut Einfluß auf die Osteomyelitisempfindlichkeit haben, ist ebenfalls nicht unbekannt. Preiswerk berichtet von Fällen nach Intoxikationen durch Injektionen von Nebennierenpräparaten. Schlatter behauptet, daß Rheumatismus ganz besonders prädisponierend sei und das auffallenderweise in den Alpenländern mehr, als sonstwo. Tatsächlich finden sich auch in den Krankengeschichten häufig schüchterne Angaben des Patienten über Rheuma, das er „vor Jahren“ schon einmal gehabt habe. Schlatter hatte unter 1670 Osteomyelitisfällen 48 mit Gelenkherden rheumatischen Ursprungs beobachtet.

Schließlich sind noch an den verschiedenen Knochen prädisponierte Stellen, und dann ist das Wachstum prädisponierend. Besondere Aufmerksamkeit verdienen hierbei wieder die Kiefer. Ebenfalls spielt bei der Osteomyelitis die *Dentitio difficilis* eine Rolle, vor allem bei Molaren, oft sogar bei Milchzähnen.

Alle disponierenden und prädisponierenden Urfachen lassen sich auf einen gemeinfamen Nenner bringen, und das ist die Schaffung eines *Locus minoris resistentiae*, der sowohl auf anatomisch-physiologischer als auch auf chemischer Grundlage bestehen kann.

In eine solche geschwächte Stelle dringen Erreger ein. Was sind nun die Erreger der Osteomyelitis? Vor einigen Jahrzehnten glaubte man noch an einen spezifischen Erreger, und es wurden Versuche an Tieren durchgeführt, die auch Erfolg hatten, indem sie wirklich Osteomyelitis hervorriefen, aber auf einem Trugschluß beruhten, da einfach Blut oder Eiter osteomyelitischer Menschen oder Tiere den Versuchstieren injiziert wurde und zwar meist in Knochennähe. Es wurde also durch einen künstlich erzeugten *Loc. min. resist.* die Osteomyelitis hervorgerufen und das nicht durch spezifische Osteomyeliserreger, sondern durch irgendeinen von Fall zu Fall verschiedenen Erreger der jeweiligen Entzündung. Auch heute gibt es noch Autoren, die hin und wieder von einem ultramikroskopischen Stäbchen sprechen, das spezifisch für Osteomyelitis sein soll.

Dieser Erreger aber existiert nicht. Mehrere Arten von Kleinlebewesen werden heute für die Krankheit verantwortlich gemacht. In den von mir bearbeiteten Krankengeschichten fand ich leider nur in 175 Fällen Angaben über bakterielle Befunde. Am häufigsten sind die Staphylokokken gefunden worden, sowohl der *Staphylokokkus pyogen. aur.*, *albus* als auch der *hämolyticus*. 120mal konnten sie festgestellt werden, davon allein in 18 von den 28 Todesfällen, der *Staphylokokkus hämolyticus* und in 4 Fällen der *pyogen. aur.* Anhängertische Staphylokokken wurden in 10 Fällen nachgewiesen. 25mal konnten Streptokokken diagnostiziert werden. Ofters waren auch Mischinfektionen von Staphylokokken und Streptokokken vorhanden. Außer diesen genannten wurden angegeben: Diplokokken, *Bakterium coli*, *Actinomyces*, Diphtheriebazillen, *Proteus*, Pneumokokken und *Pyozyaneus*. In 10 Fällen von den 175 war der Eiter steril. In der Literatur finden sich häufig Angaben über Erreger, die schon genannten werden fast immer angeführt. Es werden noch genannt: Gonokokken, Typhusbazillen und ihre Mischformen, Influenzabazillen und

die Bazillen der Mundflora. Baumgartner erwähnt noch als Erreger der Kieferosteomyelitis die Entamoeba Kartulisi.

Für die hämatogene Form der Osteomyelitis ist nach Lexer der Staphyl. pyogen. aur. verantwortlich, dann Mischinfektionen mit Staphyl. pyogen. albus, Streptok. pyogen., selten der weiße Staphylokokkus oder die Streptokokken allein. Noch seltener Pneumokokken, Typhus- und Colibazillen, Gonokokken, Influenza- und Pneumobazillen. „Osteomyelitis ist immer sekundäre Niederlassung von Bakterien“ (Lexer).

Balters beobachtete, daß der Strepto- und Pneumokokkus bei der jugendlichen Osteomyelitis eine viel größere Rolle spielt, als der Staphylokokkus, der im späteren Alter vorwiegend der Erreger ist. Nie ist die Osteomyelitis durch Pneumokokken so häufig wie bei Säuglingen (Haller, Allard und Sicard). Dagegen steht Gornouec mit seiner Angabe, daß bei Jugendlichen der Staphylokokkus fast immer der Erreger sei.

Nach Experimenten Lexers unterscheidet sich die Osteomyelitis durch den Staphylokokkus aureus nicht von der des albus, auch soll die Mischung kein besonderes Bild geben. Allerdings vertieft die Mischung von Staphylokokken und Streptokokken die Erscheinungen oft.

Es steht also fest, daß Osteomyelitis keine bakteriell spezifische Erkrankung ist.

Je nach Art und Anwesenheit der Erreger im Blut oder Eiter kann man nun außer der klinischen Diagnose auf die Art und Schwere der Osteomyelitis schließen. Wilensky gibt eine Prüfmethode an: wenn von einem Kubikzentimeter Blut 1—2 Kolonien wachsen, ist die Prognose gut, sind es 100 und mehr, ist der Verlauf sehr ernst. Auch die Therapie richtet sich hierbei nach der Anzahl der Bazillen. Bei starker Bakteriämie fordert Wilensky die Operation, bei günstiger Bakteriämie eine konservative Behandlung. Auch Hughes kommt bei sterilem Eiterbefund mit gut gefärbten Leucocyten zu einer guten und bei vielen Kokken und degenerierten Leucocyten zu einer schlechten Prognose.

Die Ausdehnung prüft Payr während der Operation nach folgenden Gesichtspunkten: die Grenzen umschriebener Eiterherde sind durch schwarzes Blut oder blutiges Serum aus den Bohrlöchern bestimmt. Im Herd ist Eiter. Die Anwesenheit von Fett im Blut und Urin und Fettröpfchen auf dem Eiter sind ebenfalls Anzeichen für Osteomyelitis.

Nakata führte Versuche darüber durch. Er fand Fettröpfchen im Venenblut nach folgender Aufstellung:

bei akuter Osteomyelitis in 87%,

bei chronischer Osteomyelitis in 29%

nach Sequestrotomie oder Auskratzung der Markhöhle sogar in 100% der Fälle. Die Kontrollversuche bei Furunkeln, Phlegmonen, Ohrenentzündungen, Knochen- und Gelenktuberkulosen waren negativ. Bei kleinen Kindern fehlen die Fettröpfchen.

Vor allem hat Freikina die Veränderungen des Blutes bei Osteomyelitis eingehend erforscht. Die Ergebnisse sind die, daß bei allgemeinen Infektionen das Protoplasma der neutrophilen Leucocyten durch die Entstehung von Körnelung ein bestimmtes Verhältnis zu diesen Krankheiten zeigt. Sämtliche Osteomyelitisformen ergeben diese Körnelung (Toxizität).

Ebenfalls berichtet Freikina weiter über die Leucocyten bei akuten und chronischen Osteomyelitiden, während sehr schwere Fälle ohne Leucocytose verlaufen. Auf Kosten der Neutrophilen entwickelt sich im Beginn der Krankheit eine mehr oder minder starke Kernverschiebung, die aber im chron. Stadium wieder kleiner wird und später zur Norm zurückkehrt. Für die Schwere der Osteomyelitis ist die Aneosinophilie bezeich-

nend. Sehr wichtig ist dann weiter die Feststellung, daß bei akuten, nicht eitrigen Periodontitiden keine Leucocytose, bei eitrigen dagegen eine kleine Erhöhung der Leucocytenzahl stattfindet.

Des weiteren beschäftigt sich P e w n y mit der Blutuntersuchung bei Osteomyelitis. Er stellt oft eine beachtliche Leucocytose fest; davon 89% Neutrophile. Lymphocyten und Eosinophile sind dagegen vermindert, und die großen Monocyten vermehrt. 2—3 Wochen nach Sequestrotomie beobachtete er bei den Patienten trotz weiteren Eiterns Abnahme der Leucocytose, aber eine weitere Vermehrung der Monocyten und außerdem noch Eosinophilie. Schließlich berichtet P r i o u x noch über Diagnostizierung durch Radiographie, die auch sonst in der Literatur öfters angeführt wird.

Das Hilfsmittel bei der Diagnose ist natürlich der Röntgenapparat, mit dem Nachteil, daß er erst mindestens 8 Tage Latenzzeit verlangt. Dann aber zeigt er uns genau die Ausbreitung der Erkrankung an.

Es ist wichtig, daß man alle diese diagnostischen Mittel kennt und sich ihrer bedient, da erst mit früher und sicherer Diagnose die Osteomyelitis erfolgreich angegangen werden kann. Den Zahnarzt gehen vor allem die Kieferosteomyelitiden an, die der Arzt nicht ohne seine Hilfe behandeln kann und soll.

In folgendem möchte ich, soweit die Krankengeschichten noch vorhanden waren, eine statistische Auswertung mit besonderer Berücksichtigung von Alter, Beruf und Geschlecht folgen lassen, bevor ich zur Beschreibung der Kieferosteomyelitis selbst schreite.

Es standen 26 Fälle zur Verfügung, von denen 2 aus der Knappschafftsberufsgenossenschaft in Bochum stammen. Bei den beobachteten Unterkieferfällen fällt auf, daß das Verhältnis der Osteomyelitis mit direkter Ursache umgekehrt ist wie bei den übrigen Knochen. Direkte Ursachen sind 13mal vorhanden. Keine direkten Ursachen 9mal. Hier tritt schon die odontogene Osteomyelitis in Erscheinung, 2 Fälle sind ohne ersichtlichen Grund entstanden, die restlichen teils odontogen, teils durch Trauma.

Was das Alter der Patienten abetrifft, fällt zuerst trotz der kleinen Anzahl der Fälle wieder der große Anteil der jugendlichen Patienten auf. Es sind 14 Fälle, wovon allein 4 Säuglinge waren. Erwachsene waren in 12 Fällen erkrankt. Das Zahlenverhältnis ist also ungefähr gleich dem der Osteomyelitis des übrigen Körpers.

Das weibliche Geschlecht ist nur mit 6 Fällen von den 26 vertreten. Hier ist im Verhältnis die Beteiligung des weiblichen Geschlechtes zum Unterschied noch etwas geringer als bei den übrigen Knochenosteomyelitiden. Und auch hier sehen wir wieder Fälle, in denen die Krankheit besonders auffallend verläuft, wie noch beschrieben werden soll.

Wenden wir uns anschließend den Berufen unserer Patienten zu, so ist auch hier das gewohnte Bild. Der Arbeiter steht an erster Stelle mit 6, es folgen die Handwerker und Beamten mit 3 und die Hausfrauen mit 3 Fällen; die übrigen sind ohne Angabe des Berufes. Erstaunlich ist hierbei vielleicht das Fehlen von Landwirten und Ackerern, die doch sonst mit einem ziemlich hohen Prozentsatz beteiligt sind, vor allem auch bei den übrigen Zahn- und Mundkrankheiten. Möglicherweise beruht das Fehlen der letztgenannten Berufe aber auch auf der kleinen Zahl der Fälle.

Wie ist nun die Osteomyelitisfrequenz bei den Kiefern selbst? Deutlich ist der Unterkiefer bevorzugt, nur 7mal war der Oberkiefer erkrankt und allein 4mal davon bei Jugendlichen bzw. Säuglingen. Im allgemeinen tritt die Osteomyelitis nur auf einer Kieferseite auf. Als meistgenannte Ursache konnte ich feststellen in 7 Fällen die Extraktion eines Zahnes,

wobei aber nur eine Oberkieferosteomyelitis die Folge war. In den 6 anderen Fällen erkrankte der Unterkiefer. An Ursachen folgen 3mal das Trauma anderer Art und 1mal ein Stoß. In 2 Fällen werden Vorkrankheiten angegeben, ein andermal Granulome und ein Gerstenkorn. In restlichen Fällen ist die Entzündung ohne ersichtliche Gründe entstanden, bzw. bleiben sie ungenannt. Ich muß mich also in der Hauptsache auch auf die Angaben der Literatur verlassen.

Zu den oben genannten Ursachen kommen noch die verschiedenen Zahnerkrankungen hinzu, z. B. Kieferhöhlenentzündungen, verlagerte Weisheitszähne, schlechte Mundpflege, Extraktionen, Tonsillitis, infizierte Milzhahnkeime und abgesprengte Zahnkeime. Ebenfalls kann aus einer einfachen Karies auf dem Wege über die Gangrän eine Osteomyelitis entstehen. Goldschmidt stellte eine kleine Statistik über die Ursachen der Kieferosteomyelitis auf:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| nach Extraktion           | 3 |
| nach Plombierung          | 1 |
| nach Karies-Periodontitis | 2 |
| nach Idiopathisch         | 3 |
| nach Typhus               | 1 |
| nach Influenza            | 1 |
| nach Masern               | 1 |

Diese Aufstellung reicht natürlich nicht, da sie die Möglichkeiten nicht gänzlich erschöpft. Das soll aber auch wohl der Zweck nicht sein; sie will nur einen Überblick über die häufigsten Ursachen ermöglichen. Auffallend häufig ist die Unterkieferosteomyelie nach Kinnfurunkeln, wie Axhausen und Hoenig berichten. Beide sahen 25 Fälle daraus entstehen. Lindner nennt 19 Fälle von Osteomyelitis, davon sind entstanden:

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| hämato-gen                       | 3  |
| nach Traumen                     | 2  |
| nach schlechter Wurzelbehandlung | 2  |
| nach Karies-Periodontitis        | 10 |
| nach Extraktion                  | 1  |

Erstaunlich ist die Tatsache, daß eine Kieferosteomyelitis nach komplizierten Kieferfrakturen sehr selten ist im Gegensatz zu den übrigen Knochen, dagegen ist nach kleinen Frakturen der Zahnwurzeln die Osteomyelitis bei Nichtbehandlung fast die Regel. Denkt man dabei aber an die der Gangrän geweihten Pulpa, so ist es verständlich, denn die Gangrän ist die Ursache bei der dentalen Osteomyelitis.

Über die Heilung ist zu sagen, daß sie durchweg gut ist, oft sogar erstaunlich sowohl bei Erwachsenen und Jugendlichen als auch bei männlichen oder weiblichen Patienten. Die Schnelligkeit der Heilung ist wesentlich größer als bei den anderen Osteomyelitiden, was von der besseren Heilungstendenz z. T. aber auch von den anatomischen Besonderheiten der Kiefer bedingt ist.

Letzteres veranlaßte mich, die Osteomyelitis der Säuglinge gesondert zu schildern, da sie eben durch besondere anatomische Bedingungen vor allen Dingen des Oberkiefers bestimmt und verändert wird. Zarfl bezeichnet diese Erkrankung der Säuglinge als sequestrierende Zahnkeimentzündung; diese soll aus nekrotisch eitriger Entzündung des Alveolarinhalts mit folgender Abstoßung der Zahnkeime entstehen. Primär befällt die Osteomyelitis allerdings nicht die Zahnkeime, sondern deren Umgebung. Ein Beweis dafür ist der Fall, den Pflüger beschreibt, wo bei einem Kind der Unterkiefer völlig eitrig eingeschmolzen wurde, ohne Infizierung der Zahnkeime der bleibenden Zähne, die sich normal entwickelten. Es mag dies vielleicht eine Besonderheit des Unterkiefers sein,

der sich in manchem vom Oberkiefer unterscheidet, was die Osteomyelitis betrifft.

Balters wendet sich deshalb mit vollem Recht gegen die Bezeichnung „sequestrierende Zahnkeimentzündung“, da ja die Entzündung der Keime nach Zarfls eigener Schilderung erst sekundär, also schließlich ein durch die besonderen anatomischen Verhältnisse bedingtes Symptom ist, während doch die Osteomyelitis die Hauptfache ist. Daher kann die Krankheitsbezeichnung Zarfls nur verwirren.

Weiter will Zarfl die sequestrierende Zahnkeimentzündung allerdings mit zwei Ursachen begründen: 1. mit der Stomatitis und der Gesichtsröte und 2. mit der Osteomyelitis als Grundlage. Das gemeinsame Endresultat beider Erkrankungen kann die Sequestrierung der Zahnkeime sein, die indes je nach der Primärerkrankung verschieden behandelt werden muß.

Der Verlauf ist nach Zarfl folgender: die von phlegmonöser Entzündung betroffenen Weichteile gehen rasch in Nekrose über, schmelzen eitrig ein, und bald darauf wird der Zahnkeim abgestoßen (12—24 Stunden). In der Regel sterben die Kinder an den Folgen einer septischen Allgemeininfektion, ehe Ausheilung der Alveolen eintritt.

In all diesen Fällen erkrankt zuerst der Knochen. Es finden sich Eiterherde im Mark, die schwere Schädigungen und Schwellungen hervorrufen. Der Prozeß greift auf das Innere der Alveole über, der Alveolarfortsatz wird aufgetrieben und Rötung und Schwellung des Schleimhautwulstes folgt. Durch die Fistelöffnungen treten die Sequester heraus, während Eiter in die Tränenkanäle, Nasenhöhle oder unter die Gesichtshaut gelangen kann.

Der Verlauf ist äußerst langwierig und die Temperatur steigt ziemlich heftig. Die klinische Diagnose wird gestellt bei Zerstörung von umschriebenen Stellen der Schleimhaut, Bloßliegen von Zahnscherben oder der geschlossenen Zahnfäckchen als cystenartige Gebilde. Die Prognose ist sehr ernst; die Behandlung ist baldige Operation. Soweit Zarfl.

Betrachten wir nun die anatomischen Verhältnisse im Säuglingsalter, so stellen wir fest, daß er je nach Alter verschieden günstig zur Ausbreitung der Osteomyelitis ist. Zum ersten ist der Knochen noch im Wachstum und durch die einliegenden über- und nebeneinandergeschachtelten wachsenden Zahnkeime im dauernden Umbau begriffen und dadurch so in Anspruch genommen, daß er gewissermaßen durch Eindringen von Erregern überrumpelt wird.

Vor allem ist der obere Eckzahnkeim, der bis in die Nähe des Orbitalwinkels reicht, ein prädisponierendes Moment zur schnellen Überleitung der Infektion auf den gesamten Oberkiefer. Mit zunehmendem Alter ändert sich die Lage. Der Alveolarfortsatz wird ausgebaut und später trennt die Kieferhöhle Orbita und Alveolarfortsatz und verhindert so das schlagartige Übergreifen.

Das bedingt einen jeweilig völlig verschiedenen Krankheitsverlauf und -ausgang. Selbstverständlich paßt sich die Behandlung diesem Umstande an.

Es muß also festgestellt werden, daß die doch physiologische Anwesenheit von Zahnkeimen nicht zur Osteomyelitis disponiert, sondern nur der rapiden Ausbreitung, der durch irgendeinen anderen Umstand von außen eingetretenen Infektion Vorstoß leistet. Ferner wird noch der Eiterabfluß durch den kammerartigen Bau des Oberkiefers verzögert. Es ist demnach auch gar nicht verwunderlich, daß mit zunehmendem Alter die Osteomyelitis prognostisch besser verlaufen muß. Ebenso ist die Tatsache, daß nach Durchbruch der Zähne bis zum Kariöswerden und

Durchbruch der Weisheitszähne eine Pause in der Osteomyelitisanfälligkeit besteht, nicht weiter erstaunlich, denn die Tatsachen sind dann so, daß der Knochen nach dem Durchbruch endlich Zeit für sich selbst hat und seine Struktur kräftigen kann. Er wird also in seiner Arbeit nach Durchbruch aller Zähne entlastet und seine Abwehrkräfte können sich voll entwickeln und überall im Körper spezialisieren. Außerdem ist die Infektion durch Karies vorläufig noch aufgeschoben und die Schleimhaut auch nicht mehr so leicht empfänglich, da sie dicker, und wenn man so sagen darf, trainierter geworden ist.

Mit den beim Alterwerden für die Osteomyelitis ungünstiger werden Bedingungen muß nun die Krankheit auf eine kleinere Stelle lokalisiert werden können, als im früheren Säuglingsalter; demnach nimmt auch die Gefährlichkeit und mit ihr die Sterblichkeit ab. Selbstredend haben frühzeitige therapeutische Maßnahmen entscheidenden Einfluß auf den Verlauf.

Warum wird nun laut Erfahrung der Oberkiefer im frühesten Kindesalter bevorzugt? Trendel stellte eine Statistik auf: er beobachtete 28 Fälle, davon waren 24 Unterkiefer- und 4 Oberkiefer-Osteomyelitiden. Balers gibt als Gründe an, daß evtl. der Oberkiefer zuerst für traumatische Einflüsse exponierter steht als der Unterkiefer. Sollte da aber nicht die eminente Widerstandskraft des Unterkiefers, die sich in der hervorragenden Heilungstendenz zeigt, eine Rolle spielen? Außerdem ist doch die Kompakta während des gesamten Wachstums stärker als die des Oberkiefers und auch die Umbauten des Unterkieferknochens in sich sind nicht so umfassend wie die des architektonisch schwächeren Oberkiefers.

Was nun die rein hämatogene Entziehung betrifft, ist diese abhängig von den anatomischen Vorbedingungen, da sie ja auch allgemein durch die das Wachsen begleitende Stromverlangsamung in den physiologisch hyperämisch gefüllten Blutgefäßen begünstigt wird. Wie selten die hämatogene Kieferosteomyelitis ist, zeigt die Aufstellung von Mantell: von 150 Fällen waren 27 hämatogen, bzw. kryptogenetischen Ursprungs und in den Fällen der Würzburger Chirurgischen Universitätsklinik aus den letzten 10 Jahren waren nur 10 Fälle hämatogen.

Balers fragt sich nun, warum denn gerade die Kiefer von Säuglingen so oft von der Krankheit befallen werden. Er will die bestehende Tatsache damit begründen, daß nirgendwo im Körper so empfindliche Organe so nahe an der Oberfläche liegen wie bei den Kiefern, nirgends sonst im Körper sich so nahe am Knochen Entzündungsvorgänge abspielen, wie hier in der Mundschleimhaut und nirgends eine so günstige Eintrittspforte für die Erreger gegeben ist, wie in den physiologischen Zahnfleischtaschen, die nie ganz frei von Entzündungen sind. Und kein Knochen ist so oft der Schauplatz von Entzündungen wie der Kieferknochen, wo oft an mehreren Stellen gleichzeitig durch gangränöse und pulpitishe Zähne und Wurzeln Krankheitserreger direkt in das Knocheninnere gelangen können. Balers fährt dann fort: „Diese Erklärung ist auch für die Häufigkeit der Periostitis der Kiefer angegeben worden und sicher wird auch darin der Grund für das so häufige Auftreten der Kieferosteomyelitis bei Erwachsenen, bei denen man Wachstumsvorgänge als prädisponierendes Moment nicht mehr heranziehen kann, zu suchen sein. Hierin möchte ich die besondere Disposition der Kiefer für die Osteomyelitis sehen und dann das Moment der hohen Empfindlichkeit der Zahnkeime während ihres Wachstums hinzuziehen, die durch schwere Allgemeinerkrankungen (Malaria, Scharlach usw.) noch erhöht wird. Man muß sich eigentlich wundern, warum die Entzündung der Alveolarfortsätze und Kiefer nicht noch viel häufiger das so gefährliche Bild macht,

wie wir es von der Osteomyelitis zu sehen gewohnt sind. Das mag seinen Grund in den guten Heilungsbedingungen haben, die erfahrungsgemäß Wunden der Mundhöhle aufweisen“.

Ich gehe noch weiter und frage, warum werden dann die Kiefer bei diesen geradezu „einladenden“ Voraussetzungen nicht noch viel öfter als andere Knochen befallen? Denn nach den obigen Tabellen über Osteomyelitis des übrigen Körpers dürfte doch erwiesen sein, daß die Kiefer nicht oft befallen werden und nur zu den felteneren Lokalisationen gerechnet werden müssen, abgesehen von den vielen Kiefermarkentzündungen, die unbeobachtet bleiben oder unerkannt durch Extraktion des schuldigen Zahnes ausheilen.

Die geringe Häufigkeit von Kieferosteomyelitis kann nur mit ungeheurer Abwehrkraft der Kiefer überhaupt begründet werden, d. h. die Konstitution entscheidet letzten Endes.

Andererseits ist aber auch nach abgeschlossenem Wachstum Spezialisierung des Abwehrapparates, oft ganz unbemerkt, soweit gediehen, daß sie entscheidend ins Gewicht fällt. Dies erklärt auch die häufige hämatogene Osteomyelitis bei Säuglingen während später die odontogene Form in den Vordergrund tritt.

Wie find nun bei den Säuglingen die Erreger der hämatogenen Osteomyelitis in die Blutbahn gelangt? Nach Chembrelent und Kallenbach kommt vor allem die Allgemeininfektion der Mutter in Betracht. Allard, Chipault und Dardenne nennen als Infektionsquelle den Genitalweg der Mutter und behaupten, daß ein Puerperalfieber der Mutter von einer Osteomyelitis des Kindes gefolgt sei. Damourette und Broca geben die Mastitis als Ursache an. Dann sind noch mangelnde Hygiene, das Füttern der Säuglingspeisen von den lieben Verwandten, der Schnuller und das Spielzeug als nicht zu übersehende Gefahrenquellen zu nennen.

Und wie äußert sich klinisch bei den Säuglingen und Kleinkindern diese Osteomyelitis? Außer den lokalen Erscheinungen tritt erhöhte Temperatur bis zu  $39^{\circ}$  und mehr auf. Es folgen Schüttelfröste, Krämpfe, Appetitlosigkeit und Verweigern der Brust. Die kleinen Kranken finden keinen Schlaf, weinen dauernd, erbrechen sich, haben Durchfälle oder Verstopfungen. Ihr Aussehen wird bleich und hinfällig. Die Schmerzen mehren sich, die Temperatur steigt weiter, der Puls wird klein und häufig. Bei Kindern treten Delirien hinzu. Schließlich erfolgt Tod.

Das ist die schwere geschlossene Osteomyelitisform. Bei der offenen Form erfolgt Temperaturabfall, und es bleiben meist nur rein örtliche Erscheinungen bestehen. Die Krankengeschichten zeigen alle mehr oder minder diesen Verlauf, sodaß ich keine besondere aufzuführen brauche.

Bricht nun im weiteren Krankheitsverlauf der Eiter von selbst durch, oder findet er operativ Abfluß, so ist die Osteomyelitis damit noch nicht beendet. Die Heilungsvorgänge nehmen je nach Schwere der Erkrankung und nach den jeweilig durch verschiedene Lebensalter bedingten anatomischen Besonderheiten der Kiefer eine verschieden lange Zeit in Anspruch. Danach muß sich auch, soll sie erfolgreich sein, jegliche Therapie richten. Denn bei Säuglingen und Kindern sind die infizierten Zahnkeime stets noch neue Herde, die die Gefahr der Weiterleitung auf den ganzen Kiefer und sämtliche Zahnkeime heraufbeschwören können. Es müssen also alle befallenen Keime entweder operativ entfernt werden, oder der Körper stößt sie ab, bzw. schmilzt er sie ein, wobei der umgebende Knochen in Mitleidenchaft gezogen wird. Der erst sekundär eiternde Keim infiziert den Nachbarn und macht ihn evtl. zum Primärherd für die Osteomyelitis der knöchernen Umgebung.

Anders bei den Erwachsenen. Dort ist meist die konservative Behandlung angezeigt, ausgenommen sind die ganz akuten Fälle, die aber nur selten in die Hand des Arztes gelangen. Sequester müssen sich abstoßen und nur unter besonderen Umständen schon früher entfernt werden. Die sich evtl. lösenden, und in Eiter schwimmenden Zähne müssen dabei grundsätzlich als Sequester betrachtet werden, ausgenommen der oder die schuldigen Zähne. Doch auch bei dieser abwartenden Therapie gibt es keine starre Regel.

Differential-diagnostisch wichtig bei Säuglings-Osteomyelitis ist noch das Wissen um den Eckzahnkeim. Dieser liegt ja hoch im unteren Orbitalwinkel und verursacht bei seiner Entzündung meist eine Fistel zum Augwinkel. Da außerdem noch Exophthalmus, Ödeme hinzutreten, werden Orbitalphlegmonen vorgetäuscht. Ferner können als Komplikationen noch Erkrankungen der Nasennebenhöhlen entstehen. Alle diese Symptome können das Bild einer Osteomyelitis so überdecken, „daß oft die Osteomyelitis des Oberkiefers übersehen wird“ (Balters). Zu bedenken ist auch, daß echte Orbitalphlegmonen nur äußerst selten sind.

Daß durch die Entfernung der entzündeten Keime sowohl später der Zahnbestand und das Wachstum des Kiefers leidet, daß vielerlei Folgezustände vor allem auch kosmetischer Art mit ihren traurigen Folgen entstehen können, ist hinreichend bekannt. Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, auch darüber zu berichten.

Die Heilung bei Säuglingen ist, wenn sie eintritt, sehr gut. Wenn die Abwehrkräfte einsetzen und sich in etwa auf die betreffenden Erreger spezialisiert haben, dann arbeiten sie mit voller Kraft. Auch sonst gilt für die Kieferosteomyelitis daselbe, wie bei der Heilung der Osteomyelitis bei den übrigen Knochen.

Bei Kindern können bei odontogener Osteomyelitis alle Milchzähne als Quellen in Betracht kommen, bei größeren Kindern sind es nach Gornouec hauptsächlich die Sechsjahrmolaren.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Osteomyelitis der Säuglinge und Kinder mehr oder minder von der der Erwachsenen verschieden ist, sie ist eine Variation, die nur bei den Kiefern auftreten kann, da bei den anderen Knochen die Verhältnisse außer denen des Wachstums nicht zu treffen.

Ferner ist durch die Modifizierung der Osteomyelitis auch eine besondere Therapie nötig, die unbedingt die verschiedenen Alter berücksichtigen muß. Zahnkeime sind vorhanden ca. bis zum 18. Lebensjahr. Daraus ergibt sich, daß nicht einfach dem Eiter Abfluß geschaffen wird, sondern jede befallene Zahnkeimalveole eröffnet werden muß, und die Keime entfernt werden müssen.

Das Röntgenbild gibt gerade hierbei eine glänzende Hilfe. Die Kieferhöhle brauchen wir bei Säuglingen nicht zu fürchten, sie entwickelt sich nach dem ersten Lebensjahr. Auch die Folgen der Zahnkeimentfernung dürfen nie bei den schweren, lebensgefährlichen Erscheinungen die Therapie beeinträchtigen.

Die Prognose wird günstiger, je älter der Patient ist. Und nach dem Alter richtet sich auch die Therapie, ob radikale Frühoperation oder abwartende Behandlung angezeigt ist.

Nun zur Kieferosteomyelitis der Erwachsenen. Alle durch Zahnkeime und Wachstum bedingten anatomischen Besonderheiten treffen hier nicht mehr zu. Es liegen hier wesentlich andere konstitutionelle und dispositionelle Verhältnisse vor.

Die Zahl der Fälle ist mit zunehmendem Alter auch wesentlich geringer. Unter ihnen nimmt der hämatogene Ursprung als Ursache auch noch weiter ab, und es bleibt fast immer bei der odontogenen bzw. trau-

matischen Urfache. Die akut-hämatogene Form bei den Erwachsenen verläuft ebenso stürmisch wie bei den Säuglingen, befällt gleich ein großes Kiefergebiet und Fieber, Schüttelfröste, Schmerz und die anderen bekannten allgemeinen Erscheinungen treten auf. Lokal entsteht Schwellung der umgebenen Weichteile, Schmerz und Rötung tritt hinzu. Der Mund kann nicht mehr ungehindert benutzt werden. Der Eiter bricht unter dem hohen Druck durch, meistens zum Munde hin. Das chronische Stadium beginnt.

Dagegen verbreitet sich bei der odontogenen Osteomyelitis der Prozeß um einen Zahn an der Wurzelspitze nach Infektion zum Kiefermark hin. Man kann annehmen, daß der Prozeß meist unbeobachtet von selbst ausheilt. Wustrow behauptet sogar, daß 75% aller Menschen, die jemals eine pathologische Veränderung des Wurzelkanalinhaltes hatten, osteomyelitisch erkrankt seien, wegen des Reizes der nekrotischen Massen, die durch keine noch so exakte Wurzelbehandlung völlig entfernt werden. Anatomisch sind die Verhältnisse zur Ausbreitung der Krankheit auch beim Erwachsenen so günstig, daß man sich wundern muß, so wenig Fälle von Kieferosteomyelitis zu beobachten. Der Kiefer muß also eine fast unbegrenzte Immunität gegen Insulte haben, die jeden anderen Knochen zu Grunde richteten. Wir kennen diese Resistenz ja auch bei der Mundschleimhaut, ebenso wie beim gesamten Verdauungstractus. Außerdem spricht ja die beinahe unbegrenzte Heilungsfähigkeit für diese Annahme.

Die Infektion allein genügt wohl nicht und es muß ein anderes Moment hinzutreten, der Loc. min. resist., der aus irgendeinem Grunde schon geschaffen ist oder noch geschaffen wird. Dann erst kommt die Entzündung des Marks zustande.

Parallel zur odontogenen Osteomyelitis läuft die traumatische. Meist ist es die Extraktion eines Zahnes, die den Anlaß gibt. Diese aber als solche ruft allein bestimmt nie eine Osteomyelitis hervor. Es gehört dazu die nachträgliche Infektion, die nun ihrerseits zufällig gerade dann nicht abgewehrt worden ist. Vor allem ist hierbei wieder die bei der Extraktion gesetzte Injektion oft die Schuldige, die nach Kantorowicz nicht nur die Reizleitung, sondern auch die so sehr differenzierte Funktion der Resistenz gegen Infektion stört.

Wenn man erfährt, daß von ca. 200 käuflichen Injektionslösungen oder -tabletten nur 4 sämtlichen Forderungen nachkommen, die man an eine derartige Lösung stellen kann, so ist diese Ansicht ohne weiteres verständlich.

Ein anderer Umstand, der die Abwehr gegen Infektion herabsetzt, kann noch die bei der Extraktion gesetzte gequetschte oder gerissene Wunde sein; Kantorowicz addiert kurz alle Umstände: Infektion durch die vorhandene Zahn- bzw. Zahnbetterkrankung, Trauma des Knochens, chemische und biologische Schädigung des Knochens durch das Injektionsmittel, wozu als allgemeiner Faktor gelegentlich noch Entkräftung durch Krankheit hinzukommen kann. Unter solchen Umständen ist die stürmische Ausbreitung der Entzündung durchaus begreiflich.

Es setzt das chronische Stadium ein, das immer gleich ist, ob es nun eine hämatogene oder eine odontogene bzw. traumatische Osteomyelitis ist. Die pathologischen Vorgänge sind fast die gleichen wie bei den übrigen Knochen. Als Unterschied möchte ich lediglich folgendes anführen: „Im Gegensatz zur Osteomyelitis langer Röhrenknochen entsteht durch diese Knochenneubildung keine Sequesterlade, weil die dünne Kompakta des Kiefers längst nekrotisiert ist, bevor die Knochenneubildung so weit fortgeschritten ist, daß man von einer Sequesterlade sprechen könnte“ (Port-Euler).

Das trifft aber wohl nur auf den Oberkiefer zu; wie überhaupt der Oberkiefer eine Sonderstellung einnimmt, denn die Unterkieferosteomyelitis gleicht den Osteomyelitiden der langen Röhrenknochen, denn der anatomische Bau ist derselbe, ausgenommen die Tatsache, daß ein Nerv durch den gesamten Kieferknochen läuft, was wir sonst nur noch beim Oberkiefer finden, und weiter die Tatsache, daß Zähne in den Kiefern sind, was die Infektionsmöglichkeiten ändert. Nicht zu vergessen ist dabei wieder die besondere Resistenz und Heilungstendenz bei den Kiefern überhaupt. Tatsächlich beschreiben hier auch die verschiedensten Autoren meist gefondert die Unterkieferosteomyelitis und die des Oberkiefers. Weitere Unterschiede sind nach Gornouec, daß der innere Unterkieferrand niemals abstirbt, während bei den anderen Knochen doch eine totale Sequestration keine Seltenheit ist. Bekannt ist auch, daß der Oberkiefer mehr zur diffusen Osteomyelitis neigt und zur geringeren Osteophytenbildung, als der Unterkiefer. Außerdem weise ich noch auf den schon oben angeführten Fall von Pflüger hin, wo bei einer kindlichen Unterkieferosteomyelitis die Zahnkeime nicht ergriffen wurden. Als Beweis sei ferner ein Fall angeführt: Der 14jährige Sohn eines Goldschmiedes bekam gleichzeitig im Ober- und im Unterkiefer einige Zähne extrahiert; es erkrankte nur der Unterkiefer osteomyelitisch. Eine chron. Schwellung trat auf, nach Inzision trat Kieferklemme hinzu (ein Zeichen dafür, daß die einfache Inzision nicht ausreichte). Nach zwei weiteren Operationen, Diätbehandlung, Lichtbädern und Röntgenbestrahlung wurde der Patient entlassen. Bei der bakteriologischen Untersuchung wurde der Staph. hämol. und auch Actinomyces festgestellt (Nebenbef.: Parotis-atrophie?).

Auffallend oft ist der untere Weisheitszahn der Grund zu der Erkrankung, seltener der obere. Der 8 ist in besonders inficibles Zellgewebe eingelagert (Wassmund). Der Knochen ist auch leicht zu infizieren. Nun bildet dort der Weisheitszahn entweder noch im Knochen liegend oder teilweise durchgebrochen durch Infektion der entstandenen Taschen die Ursache zur Osteomyelitis oft über den Weg einer Periodontitis. Der Patient geht zum Zahnarzt, der injiziert und beseitigt den Störenfried. Am selben Tage noch mehrt sich der Schmerz, die kleine Schwellung nimmt zu und Kieferklemme mit hoher Temperatur vervollständigen das Bild. Wenn nicht behandelt wird, muß die Krankheit einen bedrohlichen Verlauf nehmen. Schließlich entleert sich der Eiter, falls bis dahin keine Operation nachgeholfen hat. Das chronische Stadium folgt.

Das ist schlechterdings der Verlauf einer odontogenen Osteomyelitis. Die interessanteste Krankengeschichte, die mir zur Einsicht vorlag, möchte ich aber noch anführen, da sie bezeichnend ist und frappierend wirkt.

Frau M. W., 29 Jahre alt, gefundes Aussehen, nie krank gewesen, klagt am 7. 9. 26 über Schmerzen im Unterkiefer, die von 14 ihren Ausgang zu nehmen scheinen. Angeblich hat sich die Patientin auf einem Ausfluge stark erkältet. Sie geht zu einem Zahntechniker, der wegen der vorhandenen Brücke von 14—6 noch nichts machen will. Die Schmerzen nehmen nachts erheblich zu und veranlassen die Patientin, am nächsten Tage zu einem anderen Dentisten zu gehen. Dieser entfernt endlich die Brücke und bricht bei einem Extraktionsversuch des 14 die Zahnkrone ab. Mit eingetretener Kieferklemme und Schmerzen, die sich nun über den ganzen Unterkiefer erstrecken, sucht M. W. am 12. 9. die Kieferklinik auf. Der behandelnde Zahnarzt röntgt den Unterkiefer, ohne besonderes Resultat. Bei dem Versuch, die Wurzel aus der starken Kompakta des massigen Kiefers zu entfernen, bemerkte man, daß schon sämtliche Zähne gelockert sind, und Anästhesien im Bereich des Nervus mandibularis bestehen. Daraufhin wird die Patientin zur Chirurgischen Klinik überwiesen. Hier

werden die Weichteile in Höhe des Mundbodens gespalten. Es entleert sich wenig seröses Exsudat. Trotzdem erfolgt ausgedehnte Schwellung am horizontalen Ast des Unterkiefers, was sofortige extraorale Incision veranlaßt. Die Operation geschieht im Rausch, danach mäßige Eiterbildung. Man stößt bereits auf rauhen vom Periost entblößten Unterkieferknochen. Die Temperatur beträgt 39,6°. Sensoriumsstörungen treten hinzu. 18. 9. Die Schwellung hat sich weiter nach oben erstreckt. Beiderseitig stärkster Druckschmerz im aufsteigenden Ast. Weitere Incisionen im Rausch. Überall weißer, vom Periost entblößter und von Eiter umspülter Knochen. Drainage der Wundtaschen, leichter Gazeverband. Äußerlich dauernd Leinfampackungen, Temperatur steigt bis 40° und höher, Puls 120—130, stärkste Schmerzen im Unterkiefer. 24. 9. Incision am rechten Kieferwinkel, wo das Bindegewebe des Halses ebenfalls stark geschwollen und bretthart ist. Es entleert sich jetzt viel Eiter. Der Allgemeinzustand der Patientin verschlechtert sich sehr; da Nahrungsaufnahme per os unmöglich, erhält Patientin Nährklystiere. In den drei folgenden Tagen werden Urotropininjektionen (40% 5 ccm) intravenös und Fiebermittel gegeben. 28. 9. Alle Zähne sind maximal gelockert und hängen nur noch an der Schleimhaut fest. Häufigerer Verbandwechsel wegen größerer Eiterabsonderung. Zwischendurch Alkoholspülungen. Der Kiefer liegt am Kinn 5 cm völlig frei und ist nekrotisch. Die Infiltration und Rötung breiten sich weiter aus. Kiefergelenke sind ebenfalls erfaßt. Eiteransammlungen im Halsbindegewebe zwingen zu einer Operation. Wundrevision mit dem Finger. Überall rauher nekrotischer Knochen. In Zungenbeinhöhe beiderseits Abszesse, starke Blutung aus den Gefäßverzweigungen des Kehlkopfes. Während der Operation wird die Patientin plötzlich zyanotisch durch Zurücksinken der Zunge. Die Zungenzange läßt sich erst einführen, nachdem alle maximal gelockerten Frontzähne entfernt sind. Beim Spreitzen des Mundes mit dem Mundsperrer frakturiert der Kiefer in Kinnmitte. Es gelingt nun, den Atmungsweg freizubekommen. Kopftieflagerung, damit kein Blut und Eiter aspiriert wird. Die Pupillen sind maximal weit. Es droht Exitus. Herzspritzen, künstliche Atmung mit Erfolg. Nachts Herzmittel, Tropfeinlauf. Um den Kräftezustand zu fördern, wird in Lokalanästhesie Gastrotomie angelegt. Der Magen ist sehr geschrumpft. Ein Magenschlauch wird eingefschoben; Patientin erholt sich langsam. Häufiger Verbandwechsel und Tamponade der Gesichtswunden bilden einstweilen die Weiterbehandlung. 22. 10. Kieferknochen liegt 10 cm frei, er ist weißlich grau. Totenladenbildung sehr schwach, Kräftezustand der Patientin bessert sich. Die Blutuntersuchung ergibt steriles Blut. Die Harnuntersuchung zeigte sehr viele Oxalate, Bakterien, harnsaure Salze, Schleim, Leucocyten und Epithelien. 29. 10. Patientin kann etwas aufstehen, Kieferwunden befriedigend, eitern aber noch sehr, weitere Breiumschläge. Das Fieber geht zurück, der Kiefer liegt sehr weit frei und die Frakturenden sind infolge der Narbenschrinkung aus den Weichteilen herausgetreten. Der Kiefer sitzt noch fest, besonders in der Gelenkgegend. 15. 11. Beide Kieferhälften lassen sich ohne Schwierigkeiten und ohne Betäubung mit der Kornzange herausziehen. Der Kiefer ist gelblichweiß und stellenweise noch mit nekrotischen Periostfetzen bedeckt. Eine nach dem toten Kiefer geformte Kautschukprothese, die in der Mitte durchsägt ist, wird nach drei Tagen in Narkose eingesetzt. Dieses gelingt nur sehr schwer, da der Wundschlauch scheinbar beiderseits ganz erheblich geschrumpft ist. Die Prothese wird vorne mit Draht vereinigt und die Haut darüber in dreifacher Naht vernäht. Weiterbehandlung, Mundversorgung, Breiumschläge und Kräftigung der Patientin. Bei einem starken Gähnen springt die Prothese nach drei Tagen abends heraus. Es wird ein Silberkiefer her-

gestellt, den man in Avertinnarkose einsetzen will. Während der Operation ergibt eine Palpation in den Weichteilen des Unterkiefers einen harten Widerstand, der auf Regenerationsvorgänge eines neuen Unterkiefers schließen läßt. Der silberne Unterkiefer wird deshalb nicht eingesetzt, sondern um diesen knöchernen Widerstand wird mit dem Dechamp ein Draht geführt. Mit diesen Drähten soll versucht werden, den neuen Kiefer in die richtige Stellung zu bringen. Eine ca. 2 cm lange Schleimhautwunde in der linken Wange wird genäht. Zwecks Befestigung der Drähte bekommt die Patientin eine Gipskopfkappe. Ein leichter Gummizug zieht den Kiefer nach vorne. In den nächsten Tagen haben plötzlich beide Drähte den noch weichen Knochen durchschnitten. Um den sich neu bildenden Kiefer unter allen Umständen zu fixieren, wird ein Heftpflasterverband angelegt und an der Kopfkappe befestigt. Da man aber feststellt, daß der neue Kiefer seine richtige Stellung erhält, wird nach zwei Tagen der Stützverband entfernt und die Gipskappe abgenommen. Kieferwunden sind mittlerweile fast verheilt. Die Form des neuen Kiefers, der an verschiedenen Stellen des vital gebliebenen Periostes gebildet wird, ist befriedigend. Auch die Röntgenaufnahme zeigt teilweise Regeneration des rechten und im geringen Grade des linken Kieferastes. Auch im Kinnenteil sind Ansätze einer Knochenneubildung. Die Patientin erhält Vigantol. Der Magenschlauch wird entfernt, da Nahrungsaufnahme per os wieder möglich.

Entlassungsbefund vom 16. 1. des folgenden Jahres: Die äußeren Unterkieferwunden sind gut verheilt und festverarbt. Die Narben sind reizlos und nicht schmerzhaft. Auf der linken Seite des Kiefers besteht eine Fistel, die von der Submaxillardrüse ausgeht. Der Kiefer ist etwas geschrumpft und nach hinten gezogen. Im allgemeinen ist Kosmetik gut. Die Lippen liegen aufeinander. Die Bewegungen des Kiefers fehlen noch fast ganz. Im Munde ist die Schleimhaut verheilt, es sind keine Lücken mehr vorhanden. Bei Palpation hat man den Eindruck eines kontinuierlich knöchernen Widerstandes. Der Röntgenbefund ergibt eine gewisse Regeneration des gesamten Unterkiefers. Die Patientin fühlt sich wohl und wird gebessert in zahnärztliche Behandlung entlassen.

Die Patientin lernt bald mit ihrem neuen Kiefer essen und sprechen. Kieferbewegungen sorgen dafür, daß keine feste Verwachsung mit dem Jochbein stattfindet. Durch eine Kautschuckprothese ist die Kosmetik wesentlich gefördert, die, die Patientin en face betrachtet, nicht besser erzielt werden kann. Die Funktionstüchtigkeit des Ersatzes läßt zu wünschen übrig, da durch die Schrumpfung des Kiefers die Platzverhältnisse im Munde sehr eingeschränkt sind. Einer plastischen Operation, die diesen Mangel, eine Pseudarthrose und die besonders kosmetisch störende tief eingezogene Kinnarbe beseitigen könnte, will sich die Patientin „vorläufig“ noch nicht unterziehen.

Zirvas führte diesen Fall in seiner Dissertation an. Er erklärt die Regeneration so, daß durch das konservative Verhalten dem nekrotischen Knochen Zeit zur Loslösung vom Periostschlauch gegeben hat und dadurch seine Erhaltung, die Grundlage zur Neubildung, gewahrt wurde. Klar ist dadurch, daß das Periost eine große Resistenz und eine ungeheure regeneratorsche Kraft besitzt, die von keinem anderen Knochen erreicht wird. Sehr wichtig ist infolgedessen richtiges Abwarten, um das Periost nach Möglichkeit zu erhalten.

Ferner ist bei dem obigen Fall beachtlich, daß die gänzlich gelockerten Zähne erhalten bleiben sollten. In der einschlägigen Literatur findet man die Meinungen der Autoren in zwei Ansichten geteilt. Alle bringen sie zu ihrer Beweisführung ihre Erfahrung, gute Heilergebnisse bei ihrer Behand-

lung. Und es gibt unbestreitbar gewichtige Gründe gegen die Extraktion bei Osteomyelitis. Axhausen fordert schroff: „Die Zahnextraktion in eitrig infiziertem Gebiet ist unzweckmäßig, weil ohne Vorteil und nicht ungefährlich: sie ist daher zu unterlassen“. Dagegen stehen Otteffen, Neumann, Williger, Loos und Moral; auch Partsch sagt: „Und deshalb gibt es nur einen einzigen sicheren und unter allen Verhältnissen einzuschlagenden Weg bei solcher Gefahr: den Zahn mit seinem schädlichen Inhalt so rasch als möglich zu entfernen“.

Axhausens Gegner meinen alle den Zahn, also doch wohl den schuldigen. Nun, den will Axhausen auch extrahiert sehen. Aber er behauptet und auch andere beweisen es, daß ein an der Osteomyelitis nicht schuldiger Zahn gerettet werden kann, wenn er auch noch so locker ist, und die Prüfung eine Vitalität nicht mehr feststellen kann. Der Zahn soll gleich einem Sequester behandelt werden, d. h. erst extrahiert werden, wenn er „sequestriert“ ist (Lexer). Auch Hesse ist für die Erhaltung und verlangt eine Wartezeit von ca. drei Wochen, besonders beim Oberkiefer. Ebenso ist Wassmund der Ansicht, die er begründet: Im Beginn durch Eiterung und Auflockerung im Periodontium werden die Zähne in der Alveole beweglich. An Stelle des Knochens tritt Granulationsgewebe. Bei zunehmender Heilung wird das Gewebe wieder durch neues osteoides Gewebe ersetzt werden, und der Zahn wird wieder fest. Die Pulpen überdauern meist die Osteomyelitis, wenn sie oft auch monatelang reaktionslos bleiben.

Das beruht auf Leitungsunterbrechung des Alveolaris inferioris mit der Folge: Taubheit der Lippen (Vincent-Symptom).

Zur Kontrolle der Vitalität der Zähne dient Wassmund das Röntgenbild: zeigt es nach Osteomyelitis bei Knochenneubildung Aufhellung um die Wurzelspitze, dann ist der Zahn tot, soll aber erst in diesem Falle extrahiert oder die Wurzelspitzenresektion muß vorgenommen werden.

Vorher haben die Zähne noch die wichtige Aufgabe, die Schiene zu halten.

Balters tat den Streit um Extraktion oder Nichtextraktion ab mit den Worten: „Die Extraktion ist nicht abhängig von der Krankheitsbezeichnung, sondern vom lokalen Befund, d. h. nicht davon, ob der Zahn oder das Granulom die Ursache der Osteomyelitis war, sondern ob er der Heilung im Wege steht oder nicht. Das Symptom der Lockerung oder Zahnfestigkeit kann hier nicht leitend sein, denn während z. B. der einwurzelige Zahn gelockert sein kann, braucht der mehrwurzelige Zahn, an dessen einer Wurzel der Herd sitzt, nicht gelockert sein, weil zwei ‚gesunde‘ Wurzeln ihn halten“.

Das bedeutet Ablehnung der standardisierten Therapie. Und es ist ganz klar, daß die Osteomyelitis bei ihren mannigfachen Verläufen in jedem Fall eine individuelle Therapie erfordert, die in schweren Fällen auch den Allgemeinzustand unbedingt zu beachten hat.

Ähnlich wie die Zähne sollen auch in vielen Fällen die Sequester verschieden behandelt werden. So fordern Partsch und Williger, daß der Sequester erst entfernt wird, wenn die Knochenlade einigermaßen fest ist. Schmieden stellt als Regel auf: Nie größere Sequester herausholen, ehe nicht eine genügend feste Totenlade für die Aufrechterhaltung der Funktion garantiert. Wassmund ist gleicher Ansicht. Dagegen steht Hesse, er meint, daß das Abwarten einer Totenlade nicht nötig sei, vor allem werde bei früher Entfernung der Sequester die Heilung ganz wesentlich beschleunigt; Vorbedingung sei aber die vorherige Schienung. Hesse legt überhaupt Wert auf Fixierungsapparate. Er fordert mit Recht

bei Verdacht auf kommende Spontanfraktur schon vorher eine Bruchschiene anzufertigen, wobei die Zeit des Einsetzens gleich ist.

Auch auf die Bildung der Totenlade üben nach Hefse die Sequester keinen fördernden Einfluß aus, im Gegenteil: die Bildung des Ersatzknochens bei rechtzeitiger Sequesterentfernung geschieht sehr viel rascher.

Der Sequester soll keinstalls entfernt werden, wenn eine Fixierung sonst unmöglich ist. Wenn die Osteomyelitis lebensbedrohend ist, steht natürlich die radikale Therapie im Vordergrund und nicht die Sorge um spätere Kosmetik, so wichtig sie auch ist. Denn die psychologische Wirkung von großen kosmetischen Schädigungen ist nicht zu unterschätzen, sie kann manchem das Leben traurig gestalten, abgesehen davon, daß besonders Schauspieler und ähnliche Berufe ja in der überwiegenden Anzahl der Fälle auf eine einwandfreie Kosmetik angewiesen sind. Wegen derselben Bedenken sollen die Eingriffe vom Munde her ausgeführt werden, selbst wenn der Eiter schon vor dem Durchbruch nach außen steht.

Am besten gibt Hefse die Therapie von Kieferosteomyelitiden an, die er in folgenden Forderungen zusammenfaßt:

1. Bei der diffusen chron. verlaufenden Osteomyelitis, zumal wenn sie sich durch keine oder nur geringfügige Eiterung auszeichnet, kann man sich abwartend verhalten.

2. Bei der beginnenden vom Zahnmarktod ausgehenden Osteomyelitis ist die Diagnose nicht immer sicher zu treffen, da die akute Periodontitis dieselben klinischen Erscheinungen hervorruft.

3. Im Beginn der Osteomyelitis ist der urfächliche Zahn zu trepanieren, das nekrotische Zahnmark zu entfernen, um etwaigem Eiter Abfluß zu verschaffen. Ein etwaiger Zahnmarktod ist durch Induktionsstrom (negativ) und Röntgenkontrolle (Granulomschatten) vorher festzustellen. Besteht die Osteomyelitis schon einige Zeit, so verlagert die elektrische Untersuchung, da die Nachbarzähne in ihrer Empfindlichkeit ebenfalls herabgesetzt oder empfindungslos geworden sein können. Eine Trepanation hat, da die Osteomyelitis schon ein bestimmtes oder weiteres Knochengebiet ergriffen hat, gewöhnlich keinen Erfolg, sie wird den Verlauf nicht mehr beeinflussen können.

4. Die Trepanation des Knochens könnte man verantworten, wenn ein Granulomschatten in der Nähe einer Wurzelspitze röntgenologisch festgestellt wurde. Sonstige Trepanation auf vermutliche Herde ist zwecklos, weil unsicher. Daher keine Trepanation, Unklarheit darüber besteht auch bei den Chirurgen.

5. Für den Abfluß von Eiter ist Sorge zu tragen, in der Mundhöhle durch Jodoformgazedrainage, bei äußerer Incision durch Gummidrain.

6. In jedem Falle soll Erhaltung der Zähne angestrebt werden, besonders bei hämatogener Osteomyelitis, die Zähne sind nicht schuld.

7. Die Vornahme der von Kantorowicz geforderten Wurzelspitzenresektion sämtlicher zahnmarktoter Zähne ist abzulehnen.

8. Sequester unterhalten Eiterung, verzögern die Heilung und zweckentsprechende Knochenneubildung.

9. Mit Entfernen der Sequester versiegt die Eiterung nach spätestens zwei bis drei Tagen.

10. Daher Entfernung der Sequester, sobald Demarkation festgestellt ist. Ein zu frühes Vorgehen, vor der völligen Loslösung, ist falsch, es erfordert eine zweite Operation für spätere Sequester.

11. Durch rechtzeitige Sequesterentfernung tritt Regeneration des Kiefers nach etwas mehr als einem Monat auf, ohne daß Verdickungen wie bei der Totenladebildung auftreten. Im allgemeinen rechnet man sonst allein zur Totenladebildung drei bis sechs Monate.

12. Das Granulationsgewebe soll in den seltensten Fällen entfernt werden. Es ist ein Heilorgan, das abwehrende, resorbierende und regenerierende Kraft besitzt.

13. Die Empfehlung oder meist geübte Methode der Chirurgen osteomyelitische Unterkiefersequester durch Hautschnitte, Aufmeißelung des Knochens von außen frei zu legen und zu extrahieren, ist abzulehnen. Die von ihnen befürchtete Infektionsgefahr bei von der Mundhöhle aus ausgeführten Sequestrotomien besteht nicht. Sie vergessen, daß bei von außen entfernten Sequestern das Wundbett fast stets durch Zahnfleischfisteln mit der Mundhöhle in Verbindung steht.

14. Nur Kortikalisequester, die am unteren Rande des Unterkiefers sitzen, sind aus technischen Gründen von außen zu entfernen.

15. Das Vorgehen vom Munde aus vermeidet Kommunikationen vom Mund mit der Wange, Speichelfluß, umgeht äußere Tamponaden oder Drainagen und kieferbewegungshindernde Verbände, hinterläßt keine kosmetisch häßlich wirkende Narben.

16. Bei drohender Spontanfraktur ist wenigstens Abdruck zu nehmen, damit unter normaler Artikulation noch rechtzeitig oder jederzeit Bruchschiene angefertigt werden kann.

17. Die frühzeitig anzustrebende Sequesterentfernung bei noch nicht gebildeter Totenlade bedingt selbstverständlich noch vorhandene Zähne für Fixierung der interdentalen Bruchschiene.

18. Frühe Sequesterentfernung vom Munde aus, äußere Verbände meidende Bruchschiene und die dadurch bedingte sofortige Möglichkeit der Mund- und Kieferbewegung sind die Faktoren, die dem sich regenerierenden Kieferknochen und Kiefergelenk gleich von Anfang an Gelegenheit bieten, unter richtiger Belastung und Inanspruchnahme ihr Gerüst architektonisch aufzubauen.

19. Die Behandlung der Kieferosteomyelitis in der Hand der Chirurgen gibt gewöhnlich schlechte Resultate. Da sie in einer zahnärztlichen und chirurgischen besteht, sollen kieferosteomyelitische Kranke Zahnärzten, die eine chirurgische, oder Chirurgen, die eine zahnärztliche Ausbildung besitzen, zugeführt werden.

Diesen Forderungen ist an sich nichts mehr hinzuzufügen, es seien denn die schon oben erwähnten Maßnahmen bei Säuglingen, die je nach Alter des Patienten und der Art der Osteomyelitis abgestuft werden sollen.

Soviel über die rein lokale Therapie. Äußerst wichtig ist noch bei schlechtem Befinden eine allgemeine Behandlung des Kranken, ebenso ist es selbstverständlich, daß auch sonstige Infektionskrankheiten, organische Leiden und krankhafte Zustände aller Art berücksichtigt werden.

Und welcher Art sind die therapeutischen Maßnahmen bei der Knochenmarksentzündung der übrigen Knochen? Auch hier ist die Therapie verschieden nach Art der Krankheit und nach Alter des Patienten.

Bei der akuten selbständigen Osteomyelitis besteht die Therapie in Sequesterentfernung, Freilegung der Eiterherde, bei zentralen Herden Aufmeißelung (Nekrotomie), Tamponaden bzw. Drainagen. Bei tiefen Knochenhöhlen gestielte Hautlappen. Evtl. Knochenplombierung mit Jodoform, besser freie Gewebsplastik, besonders bei subcutanem Fettgewebe.

Bei der hämatogen purulenten akuten Osteomyelitis früh öffnen, krankes Periost entfernen, Markhöhlen öffnen und Metaphysenspongiosa der Länge nach; Gelenkkapseln und gelockerte Epiphysen nicht verletzen oder lösen. Tamponade mit Jodoformgaze. Evtl. Lagenverband, 3—5 Monate Nachbehandlung, gefensterter Gipsverbände. Zu verwerfen ist In-

cision oder Aufbohren. Evtl. Refektion, Einlegen von Knochenstücken (Anregung), deren Entfernung später nötig ist.

An Plattenknochen ist Refektion, am Schädel Aufmeißelung der Diploe und Trepanationsöffnungen für subduralen Eiter angezeigt. In schwersten Fällen Amputation oder Refektion (L e x e r).

L e j a r s schreibt unter „Dringliche Operationen“ in gespanntem Druck: „Es gibt zwei Eiterherde bei der Osteomyelitis, einen subperiostalen gelegenen Herd und einen im Markkanal, im Knochen gelegenen Herd. Sie müssen dringend notwendig den einen und den anderen öffnen. Die Operation der Osteomyelitis ist vor allem eine Trepanation des Knochens. Hüten Sie sich, es bei der Eröffnung des subperiostalen Abzesses bewenden und sich durch das Aussehen des entblößten Knochens beeinflussen zu lassen. Ohne Zweifel sehen Sie manchmal keine Fistel, keine Spur von Eiter an der kompakten Knochensubstanz, die von ihrer Hülle entblößt und gerötet ist. Halten Sie es aber dennoch für sicher, daß unter dieser Knochenlamelle Eiter vorhanden ist und eröffnen Sie den Knochen ohne Zögern“. T a y l o r behandelt die Krankheit mit „Ebbe- und Flutspülung“.

Zur lokalen Therapie kommt die Allgemeinbehandlung hinzu, deren Kenntnis auch für den Zahnarzt wichtig ist. W u s t r o w empfiehlt Höhensonne, Sollux, Röntgenbestrahlung; K i t a r i a n Rotbestrahlung.

Dann ist auf gute vitaminreiche Ernährung zu achten; zur Kräftigung auch Omnadin (intramuskulär) oder Novoprotin (intravenös) (R e i n m ö l l e r). C a n o n beschreibt die Injektion autogener Vakzine, bei schweren akuten Osteomyelitiden Rekonvaleszenten Serum und vor späterer radikaler Knochenoperation eine Kur mit autogener Vakzine. G r e v e injizierte 0,6 Salvasan intramuskulär bei posttraumatischer Unterkieferosteomyelitis. Weiter ist öfters beschrieben die Reizkörpertherapie mit Eigenblut und Milch, in schweren Fällen Aolan, Detoxin, Terpentinöl und Jod (B i e r).

Eine lokale Behandlung anderer Art ist die mit Maden und Bakteriophagen. B a e r heilt mit Maden, das sind Larven der blauen Fliege, alle 5 Tage in Menge auf die Wunde gebracht. Er meint, daß die Maden nekrotisches Gewebe lösen bzw. fressen und die Keimzahl vermindern, wobei das Wundsekret alkalisch wird. Der Erfolg sei eine Dauerheilung.

W i l s o n behandelte 26 Fälle nach B a e r, 22 Fälle heilten in durchschnittlich 10 Wochen; 7 kindliche davon in 7 Wochen. L i v i n g s t o n beschreibt die Wirksamkeit des filtrierten Extraktes aus den Körpern toter Maden, das Kulturen pyogener Bakterien vernichtet. 95% chronischer Osteomyelitiden sollen damit geheilt worden sein.

G a r s k y und C h r i s t hatten mit Bakteriophagen in Fällen von Streptokokken- und Coliinfektion geradezu frappante Heilerfolge und zwar gerade da, wo die sonstige Therapie versagte. S a s s i e r berichtet ebenfalls über schnelle Heilung einer schweren Osteomyelitis durch Phagotherapie nach vergeblicher Behandlung mit anderen Methoden. In der zahnärztlichen Rundschau, Jhrg. 1932 H. 39, ist die Osteomyelitisbehandlung durch Infizierung mit Schweißfliegenmaden ohne Angabe eines Verfassers erwähnt. Zwei Verwundete an der Front lagen mit komplizierten Frakturen sieben Tage lang im Freien. Erstaunlicherweise entstand keine Septikämie, kaum Eiterung, trotzdem die Wunden von Insektenlarven (besonders Schweißfliegenmaden) angefüllt waren.

Der Heilungsprozeß soll dabei folgender sein. Die Maden vertilgen Bakterien, ferner sezernieren sie etwas oder veranlassen die Wunde, etwas zu sezernieren, was sterilisierend wirkt. Außerdem entfernen die Maden totes Gewebe schnell, da sie sich ja von totem Fleisch, Knochen, Eiter und

Bazillen ernähren. Folge: rasche Granulationen. Die Heilungsdauer beträgt 16—18 Wochen.

An der Chirurgischen Universitätsklinik in Bonn wurden bei medikamentöser Behandlung noch angewandt: Schwarze Salbe, Unguentolanverbände, Perubalsam, Pellidol, Desitin salbe, Bor salbe, Zinkleimverbände; an physikalischen Maßnahmen wurden gegeben: Röntgenbestrahlung, Kurzwellen, Heißluftbäder und -massage, Chlorminbäder, Saugbehandlung und Diathermie. Letztere hatte nach Aussagen der Patienten oft gute Wirkung.

Auch Eigenblutinjektionen und Einspritzen von Bismut. subnitr. wurden gemacht.

Den Hauptanteil der Behandlung aber macht die Operation aus, sei es nun die Incision, Trepanation, Ausräumung der Markhöhlen, Sequestrotomie, oder die Exartikulation und die Amputation. Ebenso tritt auch bei den übrigen Knochenosteomyelitiden, wenn nötig, die Schienung hinzu, um Frakturen vorzubeugen.

Bei Säuglingen läßt man es nach Möglichkeit bei Weichteilincisionen und evtl. Trepanation bewenden, da die Restitution nach Markausräumung nur sehr träge ist. In schweren Fällen aber tritt auch hier die Operation in ihr Recht.

Wichtig ist ferner die Tamponade und unter Umständen eine gute Drainage.

In der Behandlung der Kieferosteomyelitiden wurden in der hiesigen Mund-, Zahn- und Kieferklinik außer Operationen, Drainage, Tamponaden auch Priesnitzumschläge intramuskuläre Calcium-Sandoz Injektionen verabfolgt. Teilweise wurden die Tampons mit Streptokokken Antivirus getränkt. Auch die schwarze Salbe, Bor- und Pellidol salbe wurden angewandt, ebenso wie Unguentolan.

Auf frühzeitige Schienung wurde Wert gelegt und bei Säuglingen wurden befallene Keime entfernt. Die Zähne wurden nach Möglichkeit erhalten. Physikalisch wird mit Diathermie und Kurzwellen behandelt. Mit gutem Erfolge werden die Kieferosteomyelitiden ferner durch Ozon mittels des Fissl'schen Cytozonapparates angegangen.

In der Literatur finden sich noch Angaben von Medikamenten. In den Vereinigten Staaten wird Mg.-sulfat und Potassium permanganat gebraucht. L ö h r empfiehlt die Behandlung mit Lebertranks bei Röhrenknochenmarksentzündungen. Er schildert zunächst seine Erfahrung mit Lebertran an Wunden aller Art. Weiter stellt er fest, daß in einem solchen Lebertran eingefügte Wundeitererreger wie Staphylokokken, Streptokokken und Colibazillen, schnell zugrunde gehen. Sonstige Einwirkungen sind kurz: ölige Durchdringung des nekrotischen und nekrobiotischen Gewebes sowie baldiger autolytischer Zerfall desselben; gesunde üppige Granulationen und wucherndes Epithel.

Ein weiteres Prinzip der Lebertranbehandlung ist, daß die Wunden möglichst Ruhe haben, seltener Verbandwechsel ohne Berührung der Wunden, möglichst keine Drains und Gazestreifen. Dagegen soll der Okklusivgips weitgehend herangezogen werden, um den Wundgewebsproßlingen die nötige Ruhe und die Vorzüge der Wärmekammer, gewissermaßen die Heilung unter dem „Ölschorf“ zu ermöglichen.

Der Grundgedanke ist, möglichst alles lebensfähige Gewebe zu erhalten, und sie dann maximal anzuregen im Abwehrkampf gegen die Infektion und bei der folgenden Gewebsregeneration. Es ist dies also weniger ein technisches, als biologisches Prinzip.

K l a g e s hat die L ö h r'schen Methoden angewandt, nur daß er den Gipsverband fensterte. Er wechselte ihn alle 8—14 Tage. An Hand einer

Kaufistik weist er die sehr guten Erfolge mit der Unguentolanmethode nach. Nach Löhr arbeiteten noch Zuelzer, Horrich, Jencio, Schaefer mit guten Erfolgen.

Im großen und ganzen ist die Behandlung der Osteomyelitis im Prinzip überhaupt noch umstritten. Viele wollen die Frühoperation, andere lehnen sie ab mit der Begründung, daß dem Abwehrapparat erst Zeit gelassen werden muß, Gegenmaßnahmen zu treffen. Die einen wollen nur trepanieren, die anderen wollen radikal aufmeißeln. Die Gegner der letzten Methode behaupten, es würden dadurch Keime verschleppt.

Friedemann machte daher fast stets vor der Aufmeißelung eine bakteriologische Blutuntersuchung. In den meisten Fällen konnte er auch bei klinisch durchaus harmlosen Anzeichen Kokken nachweisen. Nach der Aufmeißelung waren die Keime meist geringer an Zahl, vor allem ließen die Schmerzen schlagartig nach, und das Allgemeinbefinden besserte sich eindeutig.

Daß trotz — aber nicht wegen — der radikalen Operation der Prozeß zuweilen weitergeht, ist selbstverständlich. Friedemann führt dafür ein Beispiel an, aber auch dafür, daß bei der konservativen Behandlung eines ähnlichen Falles der Tod nicht zu verhindern war. „Soviel ist sicher: wer sich zuerst mit dem Einschnitt begnügt, wird später mehr mit Nekrosen, langwierigen Fisteln und Knochenabzessen zu tun bekommen, als derjenige, der sofort radikal operiert“ (Friedemann).

Es ist ersichtlich, daß bei allen Osteomyelitiden die Therapie individuell sein muß, wobei besonders berücksichtigt werden sollen das Alter, die Erreger, der Lokalbefund, der Allgemeinzustand und die Ausbreitungsmöglichkeit.

Zum Schluß möchte ich noch einmal kurz die Unterschiede der Kieferosteomyelitis und der Osteomyelitis des übrigen Körpers zusammenfassen:

Alle Knochen können osteomyelitisch erkranken. Die Kiefer gehören zu den selteneren Lokalisationen trotz der beinahe maximalen Möglichkeiten zu erkranken. Diese Tatsache wird von der Natur durch eine besondere Abwehr und Heilkraft ausgeglichen.

Die klinischen Allgemeinerscheinungen sind gleicher Art, ebenso der Verlauf an sich, soweit nicht die Zähne bzw. die Zahnkeime und der Nervus mandibularis und der Nervus alveolaris eine besondere Rolle spielen.

Die chronisch rezidivierenden Fälle sind bei den Kieferosteomyelitiden im Verhältnis geringer, ebenso die Todesfälle.

Das Alter und Geschlecht steht zu den übrigen Osteomyelitiden im gleichen Verhältnis.

Die Frequenz der Berufe ist dieselbe.

Durch die anatomischen Verhältnisse kommt bei den Kieferosteomyelitiden eine Totenladenbildung meist nicht vor.

Der Ursprung ist bei Kieferosteomyelitiden sehr selten hämatogen.

Die Disposition hat allgemein die gleichen Einflüsse.

Die Erreger sind bei allen Osteomyelitiden dieselben.

Das Trauma hat als Ursache bei den Kieferosteomyelitiden, vor allem bei Säuglingen, eine größere Bedeutung als sonstwo.

Zwischen Oberkiefer- und Unterkieferosteomyelitis selbst bestehen einige anatomisch bedingte Unterschiede, die sich in der Anfälligkeit und im Verlauf äußern.

Die Therapie ist prinzipiell die gleiche, bei den Kieferosteomyelitiden

nur etwas gemildeter zwecks Erhaltung der Zähne und aus kosmetischen Rücksichten, die sonst fortfallen können.

Aus letzterem resultiert die größere psychische Wirkung der Kieferosteomyelitiden durch die evtl. Folgen. Bei den übrigen Osteomyelitiden erzielt die chronisch rezidivierende Form die gleiche Wirkung.

Alle Osteomyelitiden können lebensgefährlich sein.

Prognostisch ist die Kieferosteomyelitis günstiger als alle anderen.

Da nicht unbedingt eine Totenlade bei der Kiefermarksentzündung gebildet wird, hat die Fixierung eine größere Aufgabe beim Kiefer als an den anderen Knochen.



Zum Schlusse möchte ich Herrn Professor Dr. Proell für die Überlassung des Themas, und Professor Dr. v. Redwitz für die erlaubte Benutzung der Krankengeschichten der Chirurgischen Universitätsklinik herzlichst danken.

### **Lebenslauf.**

Als Sohn des Arztes Dr. P. Schwellenbach und dessen Ehefrau Julia, geb. Gotthardt, wurde ich, Otto Schwellenbach, am 1. September 1910 in Werries bei Hamm i. W. geboren. Ich besuchte das Städtische Gymnasium in Essen-Steele, das Burggymnasium in Essen und das Gymnasium in Boppard, wo ich Ostern 1932 die Reifeprüfung bestand. Darauf studierte ich Zahnheilkunde, sämtliche 8 Semester in Bonn. Die zahnärztliche Vorprüfung legte ich am Anfang des SS. 1934 in Bonn ab. Am 2. November 1935 bestand ich in Bonn mein zahnärztliches Staatsexamen.

## Literaurangabe.

- A x h a u f e n : Die akute Kieferentzündung und ihre Stellung in der Zahnheilkunde. Deutsche zahnärztl. Wochenschrift 1934, H. 47.
- Zur Klassifikation der eitrigen Entzündungen am Kiefer. Dtsch. Monatschr. f. Zahnheilk. 1929, S. 479.
- Al b e e : Behandlung der chronischen Osteomyelitis mit Maden. Jahreskurse f. ärztl. Fortbildg. 1932, H. 12.
- B a l t e r s : Zur Behandlung der oral entstandenen Eiterungen an den Kiefern und in der Temporalgegend. Zahnärztl. Rdsch. 1924, H. 37.
- Die Kieferosteomyelitis der Kinder und Säuglinge und ihre Folgen. Dtsch. Monatschr. f. Zahnheilk. 1925, H. 8.
- B o e c k : Über Osteomyelitis der Kiefer und ihre Komplikationen. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1933, H. 19.
- C a n o n : Über kausale Therapie der akuten Osteomyelitis. Dtsch. Med. Wochenschr. 1930, H. 6.
- D e p e n d o r f : Osteomyelitis und Nekrose des Unterkiefers. Dtsch. Monatschr. d. Zahnheilk. 1911, S. 747.
- Infektiöse Osteomyelitis des Oberkiefers. Österr.-Ungar. Vierteljahresschrift f. Zahnheilk. 1910, H. 2.
- D i e r k f e n : Ein Fall von O. des O.K. Zahnärztl. Rdsch. 1933, H. 41.
- F i e l d u. A c k e r m a n n : Osteomyelitis der Mandibula. Zeitschr. f. Stomatologie, 1935, H. 24.
- F i n k e l n b u r g : Die Therapie an den Bonner Universitätskliniken.
- F i n s t e r w a l d e r : Akute Osteomyelitis im Oberkiefer. Zahnärztl. Rdsch. 1932, H. 14.
- F i t z g e r a l d : Die Behandlung von akuter Osteomyelitis des Kiefers. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1930.
- F r e i k i n a : Die Veränderung des weißen Blutbildes bei Osteomyelitis in der Klinik der odontogenen Osteomyelitis. Dtsch. Monatschr. f. Zahnheilk. 1930, H. 17/18.
- F r i e d e m a n n : Akute Osteomyelitis. Zentralblatt f. Chirurgie, 1935, H. 17.
- G o r n o u e c : Osteomyelitis des Unterkiefer. Le Revue de Stomatologie. 1927, H. 9/10.
- G r e w e : Medikamentöse Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Materia media. Ergebnisse der gesamten Zahnheilkunde, 3. Jahrg. H. 1.
- H e f f e : Fehlgriiffe in der zahnärztlichen Chirurgie. Mtsch: Fortschritte der Zahnheilk. 1925—28.
- Über Kieferosteomyelitis. Zeitschr. f. Stomatologie 1933, H. 6.
- H o e n i g : Stellung des Kinnfurunkels in der Pathogenese d. Unterkieferosteomyelitis. Dtsch. Monatschr. f. Zahnheilk. 1931, H. 15.
- H o r f c h : Therapeutische Erfahrung. Archiv f. klin. Chirurgie „Langenbecks Archiv“ Bd. 184, H. 2.
- K a n t o r o w i c z : Klinische Zahnheilkunde, Bd. 1.
- K i t a r i a n : Anatomische Bedingungen der Kieferosteomyelitis. The Dental Record, 1932, H. 11.
- K u b i k : Orbitalphlegmonen durch Osteomyelitis des Oberkiefers bei Säuglingen. Med. Klinik 1932, H. 32.
- K u w a h a t a : Neue experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der akuten eitrigen Osteomyelitis. Dtsch. Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. 222, H. 6.
- L a y t o n : Osteomyelitis des Kiefers bei Scharlach: Dtsch. Med. Wochenschr. 1929, H. 11.

- Lexner:** Allgemeine Chirurgie.
- Lindner:** Ursachen der Osteomyelitis. Dtsch. Monatschr. f. Zahnheilk. 1931, H. 12.
- Löhr:** Die Behandlung der akuten und chronischen Osteomyelitis der Röhrenknochen mit Lebertrangsips. Archiv f. klin. Chirurgie „Langenbecks Archiv“ 1934, Bd. 180.
- Lotfch:** Über Osteomyelitis des Zungenbeins. Dtsch. Med. Wochenschr. 1920, H. 38.
- Mayrhofer:** Klinische Beiträge zur Pathologie und Therapie der chirurgischen Zahnkrankheiten.
- Meuly:** Beitrag zur Frage der Zahnentfernung im eitrigen Stadium der akuten odontogenen Kieferentzündung. Zahnärztl. Rdsch. 1935, H. 8.
- Monod:** Zahnentwicklung und Kieferosteomyelitis, L'Odontologie, 1929, Bd. 67, H. 6.
- Nakata:** Zur Frage der Osteomyelitis. Dtsch. Zeitschr. f. Chirurgie. Bd. 21, H. 1/2.
- Partsch:** Die eitrige Entzündung der Kieferknochen. Handb. d. Zahnheilk.
- Pelegriani:** Osteomyelitis feltener Lokalisation. Archivio di Ortopedia, 1929, H. 45.
- Pewny:** Blutuntersuchung bei Osteomyelitis. Dtsch. Med. Wochenschr. 1924, H. 12.
- Pflüger:** Ein Fall von Osteomyelitis im Kindesalter. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1930.
- Plenz:** Über Osteomyelitis acuta und subacuta der Wirbel. Dtsch. Med. Wochenschr. 1921, H. 15.
- Port-Euler:** Lehrbuch der Zahnheilkunde.
- Preiswerk:** Lehrbuch und Atlas der Zahnheilkunde.
- Reinmöller:** Zur Therapie der Osteomyelitiden der Kiefer. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1930.
- Sassier:** Schnelle Heilung einer schweren Osteomyelitis durch Phagotherapie. La Revue de Stomatologie, 1933, H. 10.
- Schulze:** Oberflächenosteomyelitis nach Zahnbehandlung. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1922, H. 11.
- Schwarz:** Osteomyelitis der Wirbelsäule mit Beteiligung des Rückenmarks. Dtsch. Med. Wochenschr. 1920, H. 25.
- Unna:** Zwei Fälle von odontogener Osteomyelitis nach Influenza. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1921, H. 7.
- Wassmund:** Nekrose und Regeneration des Kiefergelenks. Dtsch. Med. Wochenschr. 1931, H. 14.
- Zur Osteomyelitis der Kiefer. Dtsch. Zahnärztl. Wochenschr. 1930, S. 1331.
- Wustrow:** Osteomyelitis im Bereiche der Kiefer. Med. Welt 1932, Heft 2.
- Zirvas:** Ein Fall von Sequestrierung des gesamten Unterkiefers, ausgehend von einer Caries dentis. Inaugural-Dissertation Bonn 1933.



# Nach den Krankengeschichten der Chirurgischen Universitätsklinik Bonn.

## O S T E O M Y E L I T I S

### Anteil der Berufe:

Erwachsene: 120 | Jugendliche: 263  
davon

|                    | männl.<br>100  |             |               | weibl. 20      |             |               | männl.<br>194  |             |               | weibl. 69      |             |               | Zusammen |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------|
|                    | Trauma, Unfall | Krankheiten | ohne Ursachen | Trauma, Unfall | Krankheiten | ohne Ursachen | Trauma, Unfall | Krankheiten | ohne Ursachen | Trauma, Unfall | Krankheiten | ohne Ursachen |          |
| nach :             |                |             |               |                |             |               |                |             |               |                |             |               |          |
| Arbeiter           | 12             | 4           | 7             | —              | +           | 1             | 15             | 13          | 20            | 4              | —           | 4             | 80       |
| Landwirt           | 7              | 4           | 3             | —              | —           | —             | 12             | 4           | 21            | 1              | 2           | 5             | 59       |
| Kriegsteilnehmer   | 30             | —           | —             | —              | —           | —             | —              | —           | —             | —              | —           | —             | 30       |
| Handwerker         | 4              | 1           | 3             | +              | —           | —             | 6              | 4           | 10            | 2              | 3           | 2             | 35       |
| Schmied, Schlosser | 5              | 1           | 2             | —              | —           | —             | 5              | 1           | 6             | —              | 1           | 2             | 23       |
| Ackerer            | 1              | 1           | 1             | —              | —           | +             | 5              | —           | 8             | 1              | 1           | 1             | 19       |
| Maurer             | 1              | 1           | 1             | —              | —           | —             | —              | —           | 3             | —              | —           | 2             | 8        |
| Eisenbahner        | 2              | —           | —             | —              | —           | —             | —              | 1           | 1             | —              | —           | 1             | 5        |
| Wärter, Aufseher   | 1              | —           | —             | —              | —           | —             | —              | 1           | 3             | 1              | —           | —             | 6        |
| Beamter            | —              | —           | —             | —              | —           | —             | 3              | —           | 4             | —              | 1           | —             | 8        |
| Kaufmann           | —              | —           | 1             | —              | —           | —             | —              | —           | 3             | —              | —           | 1             | 5        |
| Student, Schüler   | —              | —           | —             | —              | —           | —             | 3              | —           | 4             | —              | —           | —             | 7        |
| Polizist, Förster  | 1              | —           | —             | —              | —           | —             | —              | —           | 3             | —              | —           | —             | 4        |
| Rentner, Invalide  | 2              | 1           | 1             | —              | —           | 1             | 1              | —           | —             | —              | —           | —             | 6        |
| Hausfrau, Mädchen  | —              | —           | —             | 4              | 6           | 6             | —              | —           | —             | 1              | —           | 1             | 18       |
| ohne Berufsangabe  | —              | —           | 2             | 1              | 1           | —             | 11             | 7           | 16            | 7              | 6           | 18            | 69       |

### Todesfälle:

| nach Sitz:    |    | nach Beruf:      |    |
|---------------|----|------------------|----|
| Tibia         | 11 | Landwirt         | 8  |
| Femur         | 9  | Arbeiter         | 5  |
| Humerus       | 4  | Handwerker       | 4  |
| Clavicula     | 1  | Maschinisten     | 2  |
| Plan. popl.   | 1  | Maurer           | 1  |
| Os ileum      | 1  | Schüler          | 1  |
| Stirnbein     | 1  | ohne             | 7  |
| nach Ursache: |    | nach Alter:      |    |
| Sepsis        | 19 | bis 20 Jahren    | 25 |
| Herzschwäche  | 5  | darüber          | 3  |
| Gehirnabszeß  | 1  | nach Geschlecht: |    |
| Pneumonie     | 2  | männlich         | 19 |
| unbekannt     | 1  | weiblich         | 9  |

### Bakterien:

|                     | total |
|---------------------|-------|
| Staphyl. pyog.      | 4     |
| Staphyl. hämol.     | 18    |
| Staphyl. anhäml.    | 10    |
| Streptokokken       | 25    |
| Diplokokken         | 2     |
| Bact. coli          | 2     |
| Actinomyces         | 1     |
| Diphtherie, Proteus | 2     |
| Pneumokokkus        | 2     |
| Pyozyaneus          | 1     |
| Steril:             | 10    |

# Ursachen der Osteomyelitis:

|                        | bei Männern |              | bei Frauen |              |     |
|------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----|
|                        | sicher      | wahrscheinl. | sicher     | wahrscheinl. |     |
| Stoß, Fall             | 58          | —            | 8          | 1            | 67  |
| Kriegsverletzung       | 30          | —            | —          | —            | 30  |
| Fraktur                | 16          | —            | 1          | —            | 17  |
| Sonstige Traumen       | 15          | 1            | 2          | —            | 18  |
| Abszeß                 | 3           | 3            | 3          | 3            | 12  |
| Pneumonie              | 1           | 3            | —          | 2            | 6   |
| Rippenfellentzündung   | —           | 3            | —          | 1            | 4   |
| Typhus, Diphtherie     | 1           | 3            | —          | 1            | 5   |
| Grippe                 | 1           | 2            | —          | 1            | 4   |
| Masern                 | —           | 2            | —          | 5            | 7   |
| Scharlach              | 1           | —            | —          | —            | 1   |
| Halsentzündungen       | —           | —            | 1          | 1            | 2   |
| Tuberkulose            | —           | 1            | —          | —            | 1   |
| Geburten               | —           | —            | 1          | 1            | 2   |
| Furunkel               | 3           | 1            | 1          | 1            | 6   |
| Überanstrengung        | 3           | 6            | 1          | 1            | 11  |
| Druck                  | 3           | —            | 1          | —            | 4   |
| Rheumatismus           | —           | 2            | 1          | 3            | 6   |
| Erkältung              | —           | 4            | —          | —            | 4   |
| Metastasen             | 3           | 5            | —          | —            | 8   |
| Witterungsumschlag     | —           | 2            | —          | —            | 2   |
| Operationen            | 1           | 1            | 1          | 2            | 5   |
| Kinderlähmung          | —           | —            | —          | 1            | 1   |
| Wasserpocken           | —           | —            | —          | 1            | 1   |
| ohne ersichtl. Ursache | 98          | 18           | 35         | 8            | 159 |

## Sitz der Osteomyelitis:

|              | Bei Erwachsenen: |       |     |        |       |     | Bei Jugendlichen: |       |     |        |       |     |
|--------------|------------------|-------|-----|--------|-------|-----|-------------------|-------|-----|--------|-------|-----|
|              | männl.           |       |     | weibl. |       |     | männl.            |       |     | weibl. |       |     |
|              | Trm.             | Krkh. | oh. | Trm.   | Krkh. | oh. | Trm.              | Krkh. | oh. | Trm.   | Krkh. | oh. |
| Tibia        | 24               | 6     | 9   | 2      | 2     | 3   | 31                | 9     | 40  | 5      | 4     | 14  |
| Femur        | 19               | 6     | 6   | 1      | 2     | 3   | 21                | 6     | 29  | 3      | 10    | 8   |
| Humerus      | 13               | —     | 1   | 1      | 1     | 1   | 5                 | 7     | 15  | 2      | 1     | 6   |
| Radius       | 2                | —     | 2   | —      | —     | 1   | 2                 | 2     | 4   | 1      | —     | 2   |
| Fibula       | —                | —     | —   | —      | —     | 1   | —                 | 1     | 3   | 3      | —     | 2   |
| Ulna         | —                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | 2     | 3   | 1      | —     | 1   |
| Scapula      | 1                | —     | —   | 1      | —     | —   | —                 | 1     | —   | —      | —     | —   |
| Clavicula    | —                | —     | 1   | —      | —     | —   | 1                 | 1     | 1   | —      | 1     | —   |
| Metatarsus   | —                | 1     | —   | —      | —     | —   | —                 | —     | 1   | —      | —     | —   |
| Trochanter   | 3                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | 1     | —   | —      | —     | —   |
| Hüftbein     | —                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | —     | 1   | —      | —     | —   |
| Plan. popl.  | —                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | —     | 2   | —      | —     | —   |
| Rippen       | —                | —     | —   | 1      | —     | —   | —                 | —     | —   | —      | —     | —   |
| Finger       | —                | —     | —   | —      | —     | —   | 1                 | —     | 1   | —      | —     | —   |
| Os ischium   | —                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | 1     | —   | —      | —     | —   |
| Os ileum     | —                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | —     | —   | 1      | —     | 1   |
| Stirnbein    | 1                | —     | —   | —      | —     | —   | 1                 | —     | —   | —      | —     | —   |
| Os zygom.    | —                | —     | 1   | —      | —     | —   | —                 | —     | —   | —      | —     | —   |
| Cranium      | 1                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | —     | —   | —      | —     | —   |
| Sternum      | —                | —     | 1   | —      | —     | —   | —                 | —     | —   | —      | —     | —   |
| Darmbeinsch. | —                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | —     | —   | —      | 1     | —   |
| Hand         | 2                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | —     | —   | —      | —     | —   |
| Os cruris    | —                | —     | —   | —      | —     | —   | —                 | 1     | 1   | —      | 1     | 1   |

Die Fälle der beiden vorigen Tabellen stammen sämtlich aus der Chirurgischen Universitätsklinik Bonn.

# Osteomyelitis der Kiefer:

## Anteil der Berufe:

Erwachsene: 12 | Jugendliche: 14

davon:

| nach:      | männl. 9 |           |           | weibl. 3 |           |           | männl. 11 |           |           | weibl. 3 |           |           | Zusammen |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|            | Trauma   | Krankheit | unbekannt | Trauma   | Krankheit | unbekannt | Trauma    | Krankheit | unbekannt | Trauma   | Krankheit | unbekannt |          |
| Arbeiter   | 4        | —         | —         | —        | —         | —         | 1         | —         | —         | —        | —         | —         | 5        |
| Schlosser  | 1        | —         | —         | —        | —         | —         | —         | —         | —         | —        | —         | —         | 1        |
| Handwerker | 1        | —         | 1         | —        | —         | —         | 1         | —         | —         | —        | —         | —         | 1        |
| Beamter    | 2        | —         | —         | —        | —         | —         | —         | —         | —         | —        | —         | —         | 2        |
| Polizist   | —        | —         | 1         | —        | —         | —         | —         | —         | —         | —        | —         | —         | 1        |
| Hausfrau   | —        | —         | —         | 1        | 1         | 1         | —         | —         | —         | —        | —         | —         | 3        |
| ohne Beruf | —        | —         | —         | —        | —         | —         | —         | 1         | 7         | —        | 1         | 2         | 11       |

## Ursachen der Kieferosteomyelitis:

|                       | im Unter-<br>kiefer: | im Ober-<br>kiefer: |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Extraktion            | 6                    | —                   |
| Trauma                | 1                    | —                   |
| Fraktur               | 2                    | —                   |
| Fall, Schlag          | —                    | 1                   |
| Karies, Periodontitis | 3                    | 2                   |
| Schmutz               | 1                    | —                   |
| Metastase             | —                    | 1                   |
| unbekannt             | 6                    | 3                   |

Zahl der beobachteten Fälle (ohne Kieferosteomyelitis): 383

Davon fielen auf Erwachsene männl. Geschlechts: 100

„ weibl. „ 20

Jugendliche männl. „ 194

„ weibl. „ 69

383 Fälle

Als Jugendliche gelten hier Patienten bis zu 20 Jahren.

